

**BOLLETTINO OLIVO IMPERIA—COMUNICATO N. 22 del 12 OTTOBRE 2023**

Prosegue lentamente la maturazione dei frutti, con il progresso più evidente osservato nelle aree interne e alle quote elevate: la fase fenologica prevalente è ancora la BBCH 81, in cui le olive cambiano di colore da verde chiaro a violaceo.

Dai rilievi settimanali emerge che l'attività della mosca è in aumento e in tutti i campioni prelevati sono state rilevate **infestazioni attive superiori alla soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata (4-5%)**.

**Negli areali evidenziati in rosso in tabella** è pertanto **necessario trattare con prodotti ad azione larvicida** e attendere per la raccolta la fine dell'intervallo di sicurezza del prodotto impiegato.

Tra i prodotti ammessi dal Disciplinare nell'attuale contesto è possibile utilizzare **flupyradifurone** (*Sivanto Prime*, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (*Kestrel i.s.* 7 giorni o *Epik SL i.s.* 21 giorni, max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità).

**In alternativa al trattamento e laddove il numero massimo di tre interventi sia già stato raggiunto, è possibile procedere alla raccolta**, in tempi più o meno rapidi in relazione allo stato fitosanitario delle olive, **rispettando l'intervallo di sicurezza dell'ultimo prodotto impiegato** e prendendo accordi con il frantoio per prenotare le frangiture.

**Nelle aree evidenziate in grigio in tabella** nelle scorse settimane è stato consigliato di intervenire con prodotti ad azione larvicida oppure, in alternativa al trattamento e laddove il numero massimo di tre interventi consentiti fosse già stato eseguito, di ricorrere alla raccolta precoce delle olive. Considerato l'aumento dell'attività della mosca, **qualora la raccolta non sia ancora iniziata e non siano stati eseguiti gli ultimi interventi consigliati, si evidenzia la necessità di procedere tempestivamente alla raccolta**, per salvaguardare la produzione in particolare dal punto di vista qualitativo.

La produzione di olive è scarsa, sia per l'annata di scarica, sia per i danni causati dalla mosca olearia e dalla siccità. L'attività di molitura delle olive è di conseguenza limitata e attualmente non risultano rese al frantoio registrate dagli olivicoltori attraverso il questionario disponibile al link <https://tinyurl.com/rese23>. **Al fine di monitorare l'andamento della maturazione invitiamo pertanto i produttori a registrare le rese effettive che otterranno al frantoio nelle varie frangiture.**





**Sono tuttavia disponibili i primi dati di resa comunicati dai frantoiani** relativi a partite di olive locali lavorate negli ultimi giorni e provenienti per lo più dalle aree litoranee e di primo entroterra: **nell'areale di Dolcedo la resa media è del 19%** (min 14, max 24); **nell'areale di Diano san Pietro, la resa media è del 17,5%** (min 15,5, max 19,5).

**ASPETTI FITOSANITARI IN RACCOLTA E POST RACCOLTA**

L'impiego di scuotitori meccanici per la raccolta delle olive causa lesioni attraverso le quali possono diffondersi patologie batteriche e in particolare la **rogna dell'olivo**. Nel caso ne sia riscontrata la presenza è preferibile operare in giornate asciutte, disinfettare le parti terminali degli scuotitori tra una pianta e l'altra (es. sali quaternari di ammonio) e laddove il numero di piante colpite sia limitato, raccogliere queste per ultime. Subito dopo la raccolta intervenire con prodotti rameici, utili per contrastare anche lo sviluppo delle principali patologie fungine, quali ad esempio **l'occhio di pavone**.

Maggiori informazioni nelle schede tecniche dedicate: <http://bit.ly/RL-olivo-patologie> e <http://bit.ly/RL-occhiopavone>

**LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE**

ZONE	fascia	quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento		
	FASCIA 1 COSTA	INTERA FASCIA	Quota 0-200 m TRATTATO 28/9 o IN RACCOLTA	
	FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	Quota 0-250 m TRATTATO 28/9 o IN RACCOLTA	Quota 250-350 m TRATTATO 5/10 o IN RACCOLTA
		PONENTE	Quota 0-250 m TRATTATO 28/9 o IN RACCOLTA	Quota 250-350 m TRATTATO 5/10 o IN RACCOLTA
	FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	Quota 0-100 m TRATTATO 5/10 o IN RACCOLTA	Quota 100-350 m 6% TRATTARE o PROCEDERE ALLA RACCOLTA
		PONENTE	Quota >350 6% TRATTARE o PROCEDERE ALLA RACCOLTA	
	FASCIA 4 INTERNO	INTERA FASCIA	Fino a 250 m 5% TRATTARE o PROCEDERE ALLA RACCOLTA	Quota 250-350 m TRATTATO 5/10 o IN RACCOLTA
				Quota >350 m 6% TRATTARE o PROCEDERE ALLA RACCOLTA

Guida alla lettura dei bollettini e della tabella al link: <https://bit.ly/guida-im>

**>> OLIVICOLTURA BIO:** il 3 ottobre è stato emesso l'ultimo comunicato BIO (<https://tinyurl.com/3s4es6s6>) in cui è stato consigliato di **procedere alla raccolta in tempi brevi**.



Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale **informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo**. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizibot>

**>> CESSATO STATO GRAVE PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria a partire da martedì 10 ottobre 2023. Si raccomanda comunque di prestare sempre la massima attenzione ogni volta che si bruciano sfalci o si svolgono attività in grado di provocare scintille o fiamme nei pressi di un bosco.