



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE LIGURIA

Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

BOLLETTINO OLIVO LA SPEZIA—COMUNICATO N. 19 del 18 SETTEMBRE 2025

In tutto il territorio provinciale sono già stati consigliati i tre interventi consentiti con prodotti di sintesi ad azione larvicida e pertanto è stata suggerita l'adozione di **tecniche di difesa alternative** già a partire dalla scorsa settimana.

Tali tecniche prevedono infatti **interventi a partire dall'avvio delle ovideposizioni e da ripetersi**, nel numero e secondo la tempistica indicata nell'etichetta del prodotto commerciale impiegato, **fino alla raccolta delle olive, che dovrà essere programmata non appena i frantoi avvieranno le attività**, rispettando sempre l'intervallo di sicurezza del prodotto impiegato.

Tra i prodotti disponibili a tale scopo è possibile impiegare **esche proteiche** per ridurre le popolazioni di mosca e limitare le ovideposizioni (es. *Spintor Fly*, max 8 trattamenti **da ripetersi ogni 7 gg**, intervallo di sicurezza 7 gg; *Exirel bait* max 3 trattamenti **da ripetersi ogni 7 gg**, intervallo di sicurezza 7 gg), oppure **azadiractina A** larvicida di origine naturale con attività curativa (es. *Oikos*, max 3 trattamenti **da ripetersi ogni 10 gg**, intervallo di sicurezza 3 gg).

Dalle analisi condotte questa settimana in oliveti in cui è terminata la protezione dei trattamenti consigliati il 28 agosto emerge la presenza di infestazioni attive talvolta elevate, costituite in prevalenza da uova, e infestazioni dannose di entità rilevante. Negli areali di fascia 1 e 2 evidenziati in rosso in tabella è **necessario programmare la raccolta anticipata in funzione dello stato fitosanitario delle olive e che dovrà quindi essere tempestiva in caso di olive compromesse dal punto di vista fitosanitario o non trattate secondo le ultime indicazioni**.

In alternativa alla raccolta, laddove il numero massimo di tre interventi non sia già stato raggiunto, è possibile **intervenire tempestivamente con prodotti di sintesi ad azione larvicida e programmare la raccolta precoce in funzione dello stato fitosanitario delle olive al termine dell'intervallo di sicurezza del prodotto impiegato**.

In tal caso i prodotti di sintesi ad azione larvicida ammessi dal Disciplinare sono **flupyradifurone** (*Sivanto Prime*, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (per olive da olio: *Kestrel i.s.* 7 giorni o *Epik SL i.s.* 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità).

Si ricorda l'importanza di acidificare la soluzione per favorire l'assorbimento del prodotto e migliorarne l'efficacia e di utilizzare attrezzature efficienti in modo da distribuire adeguatamente il preparato insetticida.

Negli areali di fascia 3 evidenziati in arancione le infestazioni risultano ancora contenute e non sono necessari interventi, ma, considerata l'incidenza delle infestazioni dannose, anche in tali areali è **necessario prevedere la raccolta precoce delle olive**.

Questa settimana presso il **Laboratorio regionale di Sarzana** sono state eseguite le **prime determinazioni del contenuto in olio** allo scopo di fornire indicazioni sullo stato di maturazione delle olive e utili per pianificare le raccolte. A livello provinciale il **contenuto medio in olio espresso sul peso fresco è risultato essere circa 11,9% (min 9,7% max 14,2% e possibili rese al frantoio comprese tra 6,4% e 9,4%)**. Rispetto alla stessa settimana del 2024, i valori su fresco risultano mediamente inferiori di quasi 2 punti percentuali. Il contenuto medio in olio espresso sul peso secco è risultato essere 26,6%, in linea con i dati della stessa settimana del 2024 ed elevato per il periodo. E' opportuno ricordare che la maturazione delle olive e l'accumulo in olio dipendono da molti fattori (es. idratazione delle olive, varietà, microclima, tecnica di coltivazione, carica produttiva) per cui la variabilità tra un oliveto e l'altro può essere molto elevata, e che **la resa non è un parametro di qualità dell'olio**.

I dati relativi all'intero territorio regionale sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/inolizione2025>

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 - 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	TRATTARE** O PREPARARSI ALLA RACCOLTA		
	PONENTE	TRATTARE** O PREPARARSI ALLA RACCOLTA		—
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	TRATTARE** O PREPARARSI ALLA RACCOLTA		
	PONENTE	TRATTARE** O PREPARARSI ALLA RACCOLTA		
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	PREPARARSI ALLA RACCOLTA		
	PONENTE	PREPARARSI ALLA RACCOLTA		

****con prodotti larvicidi di sintesi, se non già impiegati nel limite dei 3 interventi, oppure proseguire la difesa con esche proteiche o insetticidi di origine naturale.**

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.** Guida alla lettura dei bollettini e della tabella al link: <https://bit.ly/guida-sp>

SITUAZIONE IDRICA

Considerato il periodo e la buona dotazione idrica dei terreni si interrompe l'elaborazione delle mappe irrigue.

METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO

>> OLIVICOLTURA BIO: si segnala che il **22 agosto** è stato emesso il comunicato BIO n. 4 (<https://tinyurl.com/3cre9vzx>), coerentemente con quanto descritto nelle **Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto** (<https://bit.ly/RLolivobio>).

