




Cofinanziato
dall'Unione europea



Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”



REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO OLIVO SAVONA—COMUNICATO N. 17 del 04 SETTEMBRE 2025



Le condizioni delle ultime settimane sono state particolarmente favorevoli all'attività di ovideposizione e allo sviluppo larvale della mosca olearia.

Dall'analisi settimanale dei campioni prelevati nelle aree in uscita dal trattamento consigliato il 14 agosto, emerge la **presenza di infestazioni attive superiori alla soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata (5-7%)**, ad eccezione della fascia 1 levante, quota 100-200, in cui attualmente l'infestazione risulta inferiore.


Nelle restanti aree in uscita dal trattamento, le infestazioni risultano costituite in prevalenza da uova e da larve di prima età, a carico delle quali **non è stata rilevata mortalità da caldo**; il modello in uso al CAAR anche questa settimana stima percentuali di mortalità esigue e pertanto **non sufficienti a contribuire al contenimento delle infestazioni** (<https://sia.regione.liguria.it/apps/sia/Modellistica>). In tali aree (evidenziate in rosso in tabella) è quindi necessario intervenire tempestivamente con prodotti ad azione larvicida.

Tra quelli ammessi dal Disciplinare nell'attuale contesto è possibile utilizzare **flupyradifurone** (per olive da olio e da mensa: Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (per olive da olio: Kestrel i.s. 7 giorni o Epik SL i.s. 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità; per olive da mensa: Kestrel i.s. 28 giorni o Epik SL i.s. 28 giorni; max 1 interventi/anno indipendentemente dall'avversità).

Si ricorda l'importanza di intervenire tempestivamente, di acidificare la soluzione per favorire l'assorbimento del prodotto e migliorarne l'efficacia e di utilizzare attrezzature efficienti in modo da distribuire adeguatamente il preparato insetticida.

Per maggiori dettagli su biologia, strategie di difesa e modalità di impiego dei principali prodotti, si rimanda alla **scheda tecnica MO-SCA DELL'OLIVO** <https://bit.ly/RLmoscaolivo>.

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0-100 m Inf. Attiva (%)	100-200 m Inf. Attiva (%)	200-350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	TRATTATO 28/08	NON TRATTARE 3%	—
	PONENTE	TRATTARE >10%	TRATTARE >10%	—
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	TRATTATO 28/08	TRATTARE >10%	TRATTATO 28/08
	PONENTE	TRATTATO 28/08	TRATTATO 28/08	TRATTATO 28/08
 FASCIA 3 ENTROTERRA	INTERA FASCIA	TRATTATO 28/08		TRATTATO 28/08

La guida alla lettura dei bollettini e alla consultazione della tabella è disponibile al link: <https://bit.ly/guida-sv>

SITUAZIONE IDRICA

Vista l'instabilità meteo delle ultime due settimane e le precipitazioni verificatesi, non sono necessari interventi irrigui.

Per verificare le previsioni meteo è possibile accedere al link <https://tinyurl.com/previsioniARPAL>.

METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO

>> **OLIVICOLTURA BIO:** si segnala che il 22 agosto è stato emesso il comunicato BIO n. 4 (<https://tinyurl.com/bdctphb>), coerentemente con quanto descritto nelle **Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto** (<https://bit.ly/RLolivobio>).



È attivo il nuovo canale WhatsApp CAAR REGIONE LIGURIA, attraverso il quale è possibile consultare i bollettini informativi e accedere a molti altri contenuti. È possibile accedere ed iscriversi tramite il QRcode a fianco oppure cliccando sul seguente link: <https://whatsapp.com/channel/0029Vaq0PhUFHWq8w6C3ch2f>

>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria: è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link <https://tinyurl.com/RLincendi2025>

