PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Cofinanziato dall'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LIGURIA
Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027—Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

GENOVA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE

Prosegue la **maturazione delle drupe**, con un'avanzata progressione dell'invaiatura nelle principali varietà che, sia a levante sia a ponente, ha raggiunto o sta raggiungendo i livelli idonei per la raccolta.



Quota 300m, cv *Pignola*

La carica produttiva si conferma generalmente medio-buona, ad eccezione degli oliveti interessati da cascola dovuta a fenomeni meteorologici avversi.

Lo **stato fitosanitario delle olive risulta generalmente ancora buono**, ma laddove le infestazioni da mosca sono iniziate da diverse settimane e non sono stati eseguiti gli interventi nelle tempistiche e con le modalità consigliate, l'incidenza delle **infestazioni dannose ha raggiunto talvolta valori elevati** e lo stato fitosanitario del prodotto risulta compromesso.

Negli oliveti interessati le olive danneggiate sono soggette a cascola.

Considerate le rese stimate, quelle reali comunicate dagli olivicoltori e dai frantoiani, laddove siano presenti infestazioni e non siano stati eseguiti gli interventi nelle tempistiche indicate, **si consiglia di procedere alla raccolta delle olive**.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

BUONE PRATICHE DI RACCOLTA DELLE OLIVE E CONSERVAZIONE DELL'OLIO

È importante **raccogliere le olive direttamente dalla pianta** e scartare quelle cadute a terra o in cattivo stato fitosanitario, avendo cura di riporre il prodotto in strati sottili e in cassette forate possibilmente in locali freschi, ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento e lontano da odori sgradevoli.

Si consiglia inoltre di **prendere accordi con il frantoio prima della raccolta**, prenotando la frangitura, in modo da **effettuare la molitura delle olive prima possibile** (possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta). Per preservare le caratteristiche dell'olio prodotto è importante **utilizzare contenitori in acciaio** o **vetro scuro**, **privi di odori, puliti** (con acqua calda e bicarbonato di sodio) **e asciutti e mantenerli colmi** al fine di limitare il contatto tra olio e aria. **I locali** di stoccaggio devono essere **asciutti e privi di odori con temperature ottimali comprese tra i 12 e i 16 °C.** Dopo 15-20 giorni in caso di olio non filtrato **è necessario effettuare il primo travaso,** per eliminare la morchia naturalmente sedimentata, limitandone così il contatto con l'olio. Si consiglia di effettuare il travaso evitando di mettere in circolo il sedimento.

Nella pianificazione della raccolta è opportuno tenere conto di diversi aspetti:

- andamento delle infestazioni e stato fitosanitario delle olive: per ottenere un **olio di qualità** è necessario frangere **olive in buono stato fitosanitario**;
- andamento della maturazione delle olive e del contenuto in olio: la maturazione delle olive influisce sulle **caratteristiche organolettiche dell'olio** prodotto; il contenuto in olio è indicativo della **resa potenziale al frantoio;**
- previsioni meteo (consultabili al link **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**): eventuali fasi di maltempo possono **interferire con le operazioni di raccolta**, prolungandone i tempi con eventuali conseguenze sullo stato fitosanitario del prodotto; l'idratazione delle olive a seguito di eventuali piogge può determinare l'abbassamento delle **rese percentuali** ed infine, eventuali eventi di forte intensità, purtroppo sempre più frequenti, potrebbero causare **cascola di prodotto**.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

ASPETTI FITOSANITARI IN RACCOLTA E POST RACCOLTA

L'impiego di scuotitori meccanici per la raccolta delle olive causa lesioni attraverso le quali possono diffondersi patologie batteriche, come la **rogna dell'olivo,** responsabile di gravi danni alle produzioni in molti areali provinciali. È necessario contrastarne la diffusione, operando in giornate asciutte, disinfettando le parti terminali degli scuotitori passando da una pianta all'altra (es. sali quaternari di ammonio) e, laddove il numero di piante colpite sia limitato, raccogliendo queste per ultime.

Subito dopo la raccolta è opportuno intervenire **con prodotti rameici**, utili anche per contrastare lo sviluppo delle principali patologie fungine quali, ad esempio, **l'occhio di pavone.**

Nel caso di **oliveti particolarmente colpiti da rogna,** è possibile abbinare al trattamento rameico anche concimi fogliari a base di rame e zinco (es. Dentamet); in tal caso, è consigliabile dimezzare le dosi di impiego di entrambi i prodotti. Maggiori informazioni nelle schede tecniche dedicate: **http://bit.ly/RL-olivo-patologie** e **http://bit.ly/RL-occhiopavone**

RESE AL FRANTOIO

Grazie alle informazioni comunicate dai frantoiani e grazie agli olivicoltori che hanno compilato il questionario, questa settimana sono **disponibili anche i primi dati relativi alle rese ottenute nelle prime frangiture** effettuate in provincia. Le rese al frantoio registrate in provincia risultano generalmente superiori rispetto a quelle stimate a partire dai dati di inolizione, risultando comprese tra 12% e 20%.

Al fine di disporre di dati sempre aggiornati, si invitano i produttori a registrare le rese effettive ottenute al frantoio nelle varie frangiture attraverso il **questionario disponibile** al link **https://tinyurl.com/Registrazionerese26**. **Tutti i dati comunicati a livello regionale**, utili per pianificare al meglio le operazioni di raccolta e aggiornati periodicamente, sono disponibili al seguente link: **https://tinyurl.com/Rese2026**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriliguriarnet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriliguriarnet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

ANDAMENTO DEL CONTENUTO IN OLIO

Comune oliveto	Varietà	Quota	Sostanza grassa su fresco %	Sostanza grassa su secco %	Resa al frantoio prevista %
Castiglione Chiavarese	Miste	240	19.5	36.73	**12.87**
Chiavari	Miste	150	21.45	38.31	**14.16**
Genova	Miste	100	22.98	40.02	**15.16**
Santa Margherita Ligure	Lavagnina/ Pignola	115	23.47	42.31	**15.49**
	MEDIA		**21.85**	**39.34**	**14.42**

Dati del 05/10/2026. I dati relativi all'intero territorio regionale sono disponibili al link: https://tinyurl.com/inolizione2026

Per l'ultima settimana vengono proposte le **determinazioni del contenuto in olio,** condotte presso il **Laboratorio regionale di Sarzana** allo scopo di fornire indicazioni sullo stato di maturazione delle olive e utili per pianificare le raccolte. **Il contenuto medio in olio espresso sul peso fresco è risultato superiore rispetto a quello rilevato la scorsa settimana di circa 1 punto percentuale (media 21,8%, min 19,5%, max 23,4% e possibili rese al frantoio comprese tra 12,8% e 15,4%).** I valori su fresco si confermano mediamente superiori a quelli della stessa settimana del 2025 di oltre 4 punti percentuali. **Il contenuto medio in olio espresso sul peso secco,** (valore non influenzato dall'idratazione delle olive e utile per valutare il progresso del processo di inolizione) **è risultato essere 39%, in diminuzione di circa 2 punti rispetto alla settimana scorsa,** ma superiore a quello della stessa settimana del 2025 di oltre 3 punti percentuali.

E' opportuno ricordare che la maturazione delle olive e l'accumulo in olio dipendono da molti fattori (es. idratazione delle olive, varietà, microclima, tecnica di coltivazione, carica produttiva) per cui la variabilità tra un oliveto e l'altro può essere molto elevata, e che **la resa non è un parametro di qualità dell'olio**.

RESE AL FRANTOIO

Al fine di monitorare l'andamento della maturazione, si invitano i produttori a registrare le rese effettive ottenute al frantoio nelle varie frangiture al link https://tinyurl.com/Registrazionerese26

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA

In tutti gli areali provinciali, compresi gli oliveti in uscita dai trattamenti consigliati il 17 settembre, l'attività della mosca olearia è risultata elevata e le infestazioni attive sono risultate ovunque superiori alla **soglia di intervento prevista dal Disciplinare di produzione integrata della Regione Liguria (5-7%).**

Considerato lo stato fitosanitario delle olive, l'andamento della maturazione e le buone rese al frantoio, si consiglia:

- **laddove non sono stati eseguiti trattamenti**, di procedere tempestivamente alla raccolta
- **laddove gli interventi consigliati sono stati eseguiti secondo le tempistiche indicate,** di pianificare la raccolta in funzione dello stato fitosanitario delle olive, rispettando sempre l'intervallo di sicurezza dei prodotti impiegati. Negli areali evidenziati in arancione in tabella, in alternativa alla raccolta, è possibile eseguire un ulteriore intervento, ma considerato quanto sopra questa opzione non è consigliata.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 – 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	PROCEDERE ALLA RACCOLTA	PROCEDERE ALLA RACCOLTA	TRATTATO 24/09 o in raccolta
	PONENTE	TRATTATO 24/09 o in raccolta	Trattato 01/10 o in raccolta	
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	TRATTATO 24/09 o in raccolta	Trattato 01/10 o in raccolta	TRATTATO 24/09 o in raccolta
	PONENTE	PROCEDERE ALLA RACCOLTA	TRATTATO 24/09 o in raccolta	Trattato 01/10 o in raccolta
 FASCIA 3 ENTROTERRA	UNICA	PROCEDERE ALLA RACCOLTA		TRATTATO 24/09 o in raccolta

Dati rilevati in collaborazione con **COOPERATIVA OLIVICOLTORI SESTRESI e APOL S.C.A.R.L.**
Modalità di lettura dei dati disponibili nel comunicato n.7: https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

È possibile utilizzare **flupyradifurone** (Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (per olive da olio: Kestrel i.s. 7 giorni o Epik SL i.s. 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità; per olive da mensa: Kestrel o Epik SL i.s. 28 giorni; max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità).

Per avere meno vincoli in fase di raccolta, si consiglia di prevedere l'impiego dei prodotti con intervallo di sicurezza più breve negli ultimi interventi, in relazione anche a possibili difficoltà organizzative dovute ad esempio a condizioni meteo avverse.

Relativamente all'impiego di tali prodotti, si ricorda che:

* devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non **appena rilevato l'avvio delle infestazioni**
* è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5)
* si consiglia di impiegare la dose massima consentita da etichetta
* prima della raccolta è necessario **rispettare l'intervallo di sicurezza riportato nell'etichetta del prodotto impiegato** e scartare il prodotto eventualmente caduto nelle reti prima che sia trascorso.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Raccolta anticipata delle olive

Si consiglia di procedere alla raccolta delle olive all'apertura dei frantoi, al fine di salvaguardare lo stato fitosanitario delle olive e la qualità dell'olio prodotto, possibilmente verificando la situazione specifica del proprio oliveto.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicata **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

Maggiori informazioni sulla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

GENOVA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

CECIDOMIA DELL'OLIVO



Prosegue la generazione autunnale dell'insetto e l'osservazione al microscopio dei giovani germogli in fase di distensione ha evidenziato la presenza di sporadiche uova.

Generalmente non si consiglia di effettuare interventi specifici in questa fase, sia perché sta per iniziare la fase di raccolta, sia perché lo sfarfallamento riguarda un numero limitato di esemplari (circa il 15 -20%) e la scalarità delle ovideposizioni rende particolarmente difficile intervenire efficacemente.

Tuttavia, poiché eventuali interventi con prodotti ad azione larvicida effettuati in questa fase contro la mosca olearia possono contribuire a contenere anche le infestazioni da cecidomia e limitarne i relativi danni, negli areali interessati, a coloro che li eseguono, si consiglia di **preferire prodotti a base di flupyradifurone** (Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni), che ha mostrato miglior efficacia contro tale parassita.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot