IMPERIA – bollettino n.13 del 06/08/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE


Prosegue la fase di accrescimento delle drupe. Nelle aree costiere continua il progressivo cambiamento di colore delle olive, dal verde intenso al verde chiaro, che interessa ora anche il primo entroterra.


Perdurano le condizioni di stress termico e idrico e in molti oliveti si osservano sintomi sempre più evidenti a carico di olive e frutti.

ANDAMENTO METEO

Le temperature massime continuano a risultare su valori molto elevati e le precipitazioni hanno interessato soltanto due stazioni meteo, con cumulati tuttavia poco significativi.

I grafici sotto riportati evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relative alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**





>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

IMPERIA – bollettino n.13 del 06/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE IDRICA

Le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 06 agosto evidenziano la **necessità di irrigare in tutti gli areali provinciali.**

Gli apporti idrici consigliati nelle diverse tipologie di terreno sono consultabili attraverso il consiglio irriguo della Regione Liguria: https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php).

>>> Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali


>>> Prima di irrigare verificare le previsioni meteo: https://tinyurl.com/previsioniARPAL

>>> Le irrigazioni possono favorire l'attività di ovideposizione della mosca e l'aumento delle infestazioni

Qualora non sia possibile irrigare, oppure come misura complementare, **può risultare particolarmente utile l'impiego di corroboranti a base di polveri di roccia, quali caolino o zeolite**, impiegati in questa fase anche per la difesa preventiva nei confronti della mosca olearia.

La pellicola bianca che tali prodotti creano sulla vegetazione riduce infatti l'assorbimento della radiazione solare in eccesso, abbassando la temperatura di foglie e frutti e limitando i fenomeni di scottatura.


La riduzione di traspirazione ed evapotraspirazione favorisce il risparmio idrico e la migliore tolleranza della coltura ai periodi di caldo intenso e siccità. In alcuni casi per aumentare la persistenza e l'uniformità della copertura, può essere utile l'associazione a specifici bagnanti-adesivanti.



IMPERIA – bollettino n.13 del 06/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA





Perdurano condizioni climatiche sfavorevoli all'attività di ovideposizione e allo sviluppo larvale e tali da determinare buona incidenza della mortalità da caldo (modello di stima disponibile al link https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php).

Dai rilievi settimanali emerge **un'attività della mosca olearia pressoché assente** e infestazioni attive massime ampiamente al di sotto della soglia di intervento del 5-7% prevista dal Disciplinare di produzione integrata della Regione Liguria.

Attualmente il rischio rimane molto basso.

Situazioni anomale possono tuttavia verificarsi in oliveti irrigui e negli oliveti più freschi e con drupe ben idratate, dove si consiglia di verificare l'effettiva incidenza di olive che presentano punture di ovideposizione e stimare il contributo della mortalità attraverso l'impiego del modello.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE	**fascia**	**quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento**		
 **FASCIA 1 COSTA**	INTERA FASCIA	**Quota 0-200 m** 0% NON TRATTARE		
 **FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA**	LEVANTE	**Quota 0-150 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 150-250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 2% NON TRATTARE
	PONENTE	**Quota 0-150 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 150-250 m** 1% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE
 **FASCIA 3 ENTROTERRA**	LEVANTE	**Quota 0-100 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 100-250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE
	PONENTE	**Quota >350** 0% NON TRATTARE		
 **FASCIA 4 INTERNO**	INTERA FASCIA	**Fino a 250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE	**Quota >350 m** NR: non rilevato

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.**

Per conoscere la fascia e la quota del proprio oliveto e individuare la cella della tabella cui fare riferimento è possibile consultare lo strumento "visualizzatore" all'indirizzo https://sia.regione.liguria.it/apps/sia/Fasce

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

IMPERIA – bollettino n.13 del 06/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Esche proteiche

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO).

Coloro che li hanno impiegati per contenere le popolazioni delle prime generazioni estive di mosca e hanno **raggiunto il numero massimo di interventi previsto** in etichetta **possono proseguire con l'altro prodotto disponibile oppure prevedere l'impiego di prodotti ad azione larvicida all'aumento delle infestazioni**, secondo quanto indicato nei bollettini.

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida.**

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Mantenere la copertura e rinnovarla tempestivamente a seguito di eventuali piogge dilavanti, poiché le condizioni immediatamente successive a tali eventi sono quelle maggiormente favorevoli alle ovideposizioni. A seconda del prodotto impiegato è possibile impiegare adesivanti che migliorano la resistenza al dilavamento.

Trappole del tipo "attract and kill"

Prevedere verifiche della cattura di esemplari di mosca dell'olivo e dell'andamento delle infestazioni, in particolare quando i bollettini ne segnaleranno l'aumento.

Tali tecniche, consigliate anche in produzione integrata, possono contribuire al contenimento delle infestazioni nel periodo estivo e possono essere integrate al bisogno con altre tecniche e tipologie di prodotto ammesse.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**