IMPERIA – bollettino n.14 del 13/08/2026


Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)


SITUAZIONE ATTUALE

Prosegue la fase di accrescimento delle drupe. Nelle aree litoranee e di prima collina si rileva l'inizio della fase di maturazione (BBCH 80), con il progressivo viraggio del colore dal verde intenso al verde chiaro-giallastro, fenomeno che interessa anche il primo entroterra della fascia 2. Permangono condizioni di forte stress termico e idrico, con sintomi sempre più evidenti su foglie e frutti e presenza di olive rattrappite a causa della siccità e del caldo prolungato.

ANDAMENTO METEO

Le temperature massime continuano a risultare su valori molto elevati e alcuni areali sono stati interessati da precipitazioni significative. I grafici sotto riportati evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relative alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**





>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori dettagli nel Decreto al link **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

IMPERIA – bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE IDRICA


Le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 13 agosto evidenziano la **necessità di irrigare in tutti gli areali provinciali.**


>>> Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali

>>> Prima di irrigare verificare le previsioni meteo: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**

>>> Le irrigazioni possono favorire l'attività di ovideposizione della mosca

Gli apporti idrici consigliati nelle diverse tipologie di terreno sono consultabili attraverso il consiglio irriguo della Regione Liguria: **https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php**).





IMPERIA – bollettino n.14 del 13/08/2026



Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA

Anche questa settimana le condizioni climatiche sono risultate particolarmente sfavorevoli all'attività della mosca olearia. Le olive mostrano attualmente uno stato fitosanitario eccellente. Laddove si sono verificate ovideposizioni, la mortalità larvale rilevata nei campioni è risultata pressoché totale (modello di stima disponibile al link: **https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php**).

Non si osserva un avvio significativo della seconda generazione estiva di mosca e le infestazioni attive risultano ovunque inferiori alla soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria.

Eventuali criticità possono verificarsi in oliveti irrigui e con drupe ben idratate o al mutare delle condizioni climatiche, a seguito di precipitazioni e abbassamento delle temperature che potrebbero favorire l'avvio delle infestazioni

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE	**fascia**	**quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento**		
 **FASCIA 1 COSTA**	INTERA FASCIA	**Quota 0-200 m** 0% NON TRATTARE		
 **FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA**	LEVANTE	**Quota 0-150 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 150-250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 1% NON TRATTARE
	PONENTE	**Quota 0-150 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 150-250 m** 2% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE
 **FASCIA 3 ENTROTERRA**	LEVANTE	**Quota 0-100 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 100-250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE
	PONENTE	**Quota >350** 0% NON TRATTARE		
 **FASCIA 4 INTERNO**	INTERA FASCIA	**Fino a 250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE	**Quota >350 m** 0% NON TRATTARE

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.**

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: **https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

IMPERIA – bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida,** ma potrebbe essere necessario intervenire tempestivamente al mutare delle condizioni climatiche.

Si ricorda che tali prodotti devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non **appena rilevato l'avvio delle infestazioni**. Si ricorda inoltre che è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5) e utilizzare la dose massima consentita da etichetta. La miscela con concimi fogliari o biostimolanti può favorire l'assorbimento del prodotto e migliorarne l'efficacia.

Esche proteiche

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO).

Coloro che le stanno impiegando possono continuare a farlo secondo i limiti e le indicazioni riportate in etichetta, ma in caso di avvio rilevante delle infestazioni si consiglia di prevedere l'impiego di prodotti ad azione larvicida.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Mantenere la copertura e ripristinarla tempestivamente in caso di piogge dilavanti, considerando tuttavia che il periodo successivo al ferragosto è generalmente più favorevole all'attività della mosca olearia e caratterizzato da infestazioni più rilevanti. In tali situazioni, valutare la possibilità di integrare tale tecnica con l'impiego di esche proteiche o prodotti ad azione larvicida consentiti in BIO (es. Oikos)

Azadircatina A (Oikos)

Si tratta di un prodotto di origine naturale da impiegarsi all'avvio delle ovideposizioni e da ripetersi a distanza di circa 7-10 giorni dal precedente fino a un massimo di 3 volte.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot