IMPERIA – bollettino n.15 del 20/08/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE



Prosegue la fase fenologica di inizio maturazione (BBCH 80) e in numero sempre maggiore di oliveti delle aree litoranee e di prima collina è possibile osservare olive che cambiano di colore da verde cupo a verde chiaro giallastro.

Lo stato fitosanitario delle olive risulta molto buono, soprattutto grazie all'assenza di attacchi significativi di mosca olearia nel corso di tutto il periodo estivo, ma lo sviluppo delle drupe risulta compromesso dal perdurare delle condizioni di elevato stress idrico.

Attualmente le olive risultano infatti per lo più di dimensione ridotta e spesso raggrinzite.

L'immagine è relativa a un oliveto di prima collina, dove le olive presentano dimensioni ridotte ed evidenti sintomi dello stress idrico, evidenti anche sulle foglie. Limitatamente ad alcuni oliveti di prima collina caratterizzati da terreni particolarmente asciutti, è stata rilevata una riduzione della resistenza al distacco del picciolo in olive sane, potenzialmente correlata a cascola.

>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori dettagli nel Decreto al link **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**


REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot


IMPERIA – bollettino n.15 del 20/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

ANDAMENTO METEO

Le temperature hanno subito una diminuzione in occasione delle recenti precipitazioni, che sono risultate significative in diversi areali provinciali. I grafici sotto riportati evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relativo alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**





SITUAZIONE IDRICA

Le elaborazioni meteo saranno condotte nella giornata di domani, in modo tale da poter considerare eventuali precipitazioni della giornata odierna, che unitamente a quelle già registrate, dovrebbero risultare sufficienti a ripristinare, almeno parzialmente, le riserve idriche.

Non si prevede pertanto la necessità di intervenire con apporti irrigui, ma per conferma si invita a consultare le prossime elaborazioni meteo al link: **https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php**.

IMPERIA – bollettino n.15 del 20/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA



Sebbene nel corso della settimana le condizioni meteo siano cambiate, iniziando a risultare più favorevoli all'attività della mosca, dall'attività di monitoraggio **non risultano infestazioni rilevanti in corso**.

Oltre al contributo ancora rilevante della mortalità da caldo (modello di stima disponibile al link: **https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php**) può influire in tal senso anche la ridotta dimensione delle olive e lo stato di disidratazione delle stesse, tale da renderle poco appetibili per le ovideposizioni.

Attenzione al calo termico e alle precipitazioni

Nelle prossime 24-36 ore sono previste precipitazioni rilevanti, con conseguente calo termico, che potrebbero favorire la buona idratazione delle drupe. A seguito del cambiamento meteo previsto è pertanto **atteso l'avvio delle infestazioni.** Si invitano gli olivicoltori a **prepararsi a intervenire tempestivamente, verificando se possibile la situazione nel proprio oliveto o consultando il prossimo comunicato.**

Si ricorda infatti che i prodotti ad azione larvicida disponibili sono efficaci sulle forme larvali giovani e pertanto è necessario intervenire all'avvio delle infestazioni.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE	fascia	quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento		
 **FASCIA 1 COSTA**	INTERA FASCIA	**Quota 0-200 m** 0% NON TRATTARE		
 **FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA**	LEVANTE	**Quota 0-150 m** 1% NON TRATTARE	**Quota 150-250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 2% NON TRATTARE
	PONENTE	**Quota 0-150 m** 1% NON TRATTARE	**Quota 150-250 m** 1% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE
 **FASCIA 3 ENTROTERRA**	LEVANTE	**Quota 0-100 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 100-250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE
	PONENTE	**Quota >350** 0% NON TRATTARE		
 **FASCIA 4 INTERNO**	INTERA FASCIA	**Fino a 250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE	**Quota >350 m** 0% NON TRATTARE

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.**

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: **https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

IMPERIA – bollettino n.15 del 20/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida, ma potrebbe essere necessario intervenire tempestivamente a seguito del previsto e imminente cambiamento delle condiziono meteo**.

Sarà possibile utilizzare **flupyradifurone** (Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (per olive da olio: Kestrel i.s. 7 giorni o Epik SL i.s. 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità; per olive da mensa: Kestrel i.s. 28 giorni o Epik SL i.s. 28 giorni; max 1 interventi/anno indipendentemente dall'avversità).

Per avere meno vincoli in fase di raccolta, si consiglia di prevedere l'impiego dei prodotti con intervallo di sicurezza più breve negli ultimi interventi, in relazione anche a possibili difficoltà organizzative dovute ad esempio a condizioni meteo avverse.

Relativamente all'impiego di tali prodotti, si ricorda che:

* devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non **appena rilevato l'avvio delle infestazioni**
* è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5)
* si consiglia di impiegare la dose massima consentita da etichetta.
* la miscela con concimi fogliari o biostimolanti favorisce l'assorbimento del prodotto e ne migliora l'efficacia.

Esche proteiche

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO).

Coloro che le stanno impiegando possono continuare a farlo secondo i limiti e le indicazioni riportate in etichetta, ma si ricorda che **in caso di elevata pressione della mosca il contenimento delle infestazioni potrebbe essere limitato** e risulta pertanto necessario verificarne l'andamento e integrare la difesa con l'impiego di prodotti ad azione larvicida.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicata **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

IMPERIA – bollettino n.15 del 20/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Ripristinare tempestivamente la copertura in caso di piogge dilavanti.

Verificare tuttavia le previsioni meteo e la frequenza delle precipitazioni previste per valutare l'opportunità di proseguire con gli interventi.

Nel caso non sia possibile mantenere una buona copertura è necessario passare ad altre tecniche di difesa, prevedendo l'impiego di altri prodotti consentiti in BIO, quali esche proteiche (es. Spintorfly) o prodotti ad azione larvicida (es. Oikos).

Azadiractina A (Oikos)

Si tratta di un prodotto di origine naturale **da impiegarsi all'avvio delle ovideposizioni e da ripetersi a distanza di circa 7-10 giorni dal precedente fino a un massimo di 3 volte**.

Raccolta anticipata delle olive

Si ricorda che le tecniche di difesa disponibili in agricoltura BIO hanno una efficacia limitata in caso di elevata pressione della mosca olearia.

In caso di infestazioni in corso, situazione assai frequente e attesa per il periodo di fine estate-inizio autunno, si consiglia di prevedere la raccolta all'apertura dei frantoi, al fine di salvaguardare lo stato fitosanitario delle olive e la qualità dell'olio prodotto.

Maggiori informazioni sulla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio**