IMPERIA – bollettino n.16 del 27/08/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE



Prosegue la fase fenologica di inizio maturazione (BBCH 80) e, in un numero sempre maggiore di oliveti delle aree litoranee e di prima collina, è possibile osservare olive che cambiano di colore, passando dal verde cupo al verde chiaro-giallastro.

Tra il 20-21 e il 25 agosto, eventi temporaleschi hanno interessato la provincia, con piogge diffuse e un temporaneo calo termico; alcuni areali sono stati inoltre interessati da fenomeni grandinigeni, in particolare nel comune di Imperia, nell'area interna della bassa Valle Impero e nel Dianese.

Le recenti precipitazioni hanno determinato una temporanea attenuazione dello stress idrico che ha caratterizzato la stagione, con effetti positivi sullo sviluppo delle drupe.

>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori dettagli nel Decreto al link **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**


REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot


IMPERIA – bollettino n.16 del 27/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

ANDAMENTO METEO

Le temperature hanno registrato una diminuzione in concomitanza di fenomeni precipitativi significativi. I grafici sotto riportati evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relativo alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**





SITUAZIONE IDRICA

Le recenti piogge hanno ripristinato le riserve idriche, come emerge dalle elaborazioni meteo aggiornate (**https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php**); considerando la fenologia e l'avanzamento della stagione, **attualmente non si prevede la necessità di intervenire con apporti irrigui e dalla prossima settimana non sarà più presente il consiglio irriguo.**

IMPERIA – bollettino n.16 del 27/08/2026



Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA

Sebbene nel corso della settimana le condizioni meteo siano risultate più favorevoli all'attività della mosca, **attualmente** dall'attività di monitoraggio **non risultano infestazioni rilevanti in corso,** e lo sviluppo della seconda generazione appare comunque contenuto, in quanto le elevate temperature diurne superiori ai 30°C riducono l'attività dannosa della mosca. (**https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php**).

Attenzione al calo termico e alle precipitazioni

Nonostante attualmente si siano rilevate infestazioni ancora **contenute**, si invitano gli olivicoltori a **consultare il prossimo comunicato** per verificare l'evoluzione dell'attività della mosca, e a **prepararsi eventualmente per intervenire in maniera tempestiva, verificando se possibile la situazione nel proprio oliveto.** Si ricorda infatti che i prodotti ad azione larvicida disponibili sono efficaci sulle forme larvali giovani e pertanto è necessario intervenire all'avvio delle infestazioni.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE	fascia	quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento		
 FASCIA 1 COSTA	INTERA FASCIA	**Quota 0-200 m** 0% NON TRATTARE		
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	**Quota 0-150 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 150-250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 1% NON TRATTARE
	PONENTE	**Quota 0-150 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 150-250 m** 2% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 1% NON TRATTARE
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	**Quota 0-100 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 100-250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE
	PONENTE	**Quota >350** 0% NON TRATTARE		
 FASCIA 4 INTERNO	INTERA FASCIA	**Fino a 250 m** 0% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m** 0% NON TRATTARE	**Quota >350 m** 0% NON TRATTARE

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.**

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: **https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Cofinanziato dall'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LIGURIA
Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027—Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

IMPERIA – bollettino n.16 del 27/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida, ma potrebbe essere necessario intervenire tempestivamente a seguito di un cambiamento delle condizioni meteo**.

Sarà possibile utilizzare **flupyradifurone** (Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (per olive da olio: Kestrel i.s. 7 giorni o Epik SL i.s. 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità; per olive da mensa: Kestrel i.s. 28 giorni o Epik SL i.s. 28 giorni; max 1 interventi/anno indipendentemente dall'avversità).

Per avere meno vincoli in fase di raccolta, si consiglia di prevedere l'impiego dei prodotti con intervallo di sicurezza più breve negli ultimi interventi, in relazione anche a possibili difficoltà organizzative dovute ad esempio a condizioni meteo avverse.

Relativamente all'impiego di tali prodotti, si ricorda che:

* devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non **appena rilevato l'avvio delle infestazioni**
* è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5)
* si consiglia di impiegare la dose massima consentita da etichetta.
* la miscela con concimi fogliari o biostimolanti favorisce l'assorbimento del prodotto e ne migliora l'efficacia.

Esche proteiche

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO).

Coloro che le stanno impiegando possono continuare a farlo secondo i limiti e le indicazioni riportate in etichetta, ma si ricorda che **in caso di elevata pressione della mosca il contenimento delle infestazioni potrebbe essere limitato** e risulta pertanto necessario verificarne l'andamento e integrare la difesa con l'impiego di prodotti ad azione larvicida.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicata **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

IMPERIA – bollettino n.16 del 27/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Ripristinare tempestivamente la copertura in caso di piogge dilavanti.

Verificare tuttavia le previsioni meteo e la frequenza delle precipitazioni previste per valutare l'opportunità di proseguire con gli interventi.

Nel caso non sia possibile mantenere una buona copertura è necessario passare ad altre tecniche di difesa, prevedendo l'impiego di altri prodotti consentiti in BIO, quali esche proteiche (es. Spintorfly) o prodotti ad azione larvicida (es. Oikos).

Azadiractina A (Oikos)

Si tratta di un prodotto di origine naturale **da impiegarsi all'avvio delle ovideposizioni e da ripetersi a distanza di circa 7-10 giorni dal precedente fino a un massimo di 3 volte**.

Raccolta anticipata delle olive

Si ricorda che le tecniche di difesa disponibili in agricoltura BIO hanno una efficacia limitata in caso di elevata pressione della mosca olearia.

In caso di infestazioni in corso, situazione assai frequente e attesa per il periodo di fine estate-inizio autunno, si consiglia di prevedere la raccolta all'apertura dei frantoi, al fine di salvaguardare lo stato fitosanitario delle olive e la qualità dell'olio prodotto.

Maggiori informazioni sulla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot