IMPERIA – bollettino n.23 del 15/10/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE



Dal punto di vista fenologico, le olive delle aree litoranee e di primo entroterra hanno raggiunto la maturazione di raccolta (prevalenza di olive che hanno raggiunto la colorazione tipica della varietà), mentre nelle aree interne prosegue la fase di invaiatura.

Le ultime precipitazioni hanno favorito l'idratazione delle drupe dopo un lungo periodo di stress idrico, ma hanno causato anche in alcuni casi cascola di olive e determinato condizioni maggiormente favorevoli all'attività di ovideposizione della mosca.

Le infestazioni attive risultano infatti in aumento, in particolare in quegli oliveti in cui i sintomi da stress idrico sono stati meno accentuati.

Considerati i dati delle rese al frantoio, si consiglia di **pianificare la raccolta anticipata delle olive, in funzione dello stato fitosanitario e dell'andamento delle infestazioni.**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

IMPERIA – bollettino n.23 del 15/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

BUONE PRATICHE DI RACCOLTA DELLE OLIVE E CONSERVAZIONE DELL'OLIO

È importante **raccogliere le olive direttamente dalla pianta** e scartare quelle cadute a terra o in cattivo stato fitosanitario, avendo cura di riporre il prodotto in strati sottili e in cassette forate possibilmente in locali freschi, ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento e lontano da odori sgradevoli.

Si consiglia inoltre di **prendere accordi con il frantoio prima della raccolta**, prenotando la frangitura, in modo da **effettuare la molitura delle olive prima possibile** (possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta).

Per preservare le caratteristiche dell'olio prodotto è importante **utilizzare contenitori in acciaio** o **vetro scuro**, **privi di odori, puliti** (con acqua calda e bicarbonato di sodio) **e asciutti e mantenerli colmi** al fine di limitare il contatto tra olio e aria. **I locali** di stoccaggio devono essere **asciutti e privi di odori con temperature ottimali comprese tra i 12 e i 16 °C.** Dopo 15-20 giorni in caso di olio non filtrato **è necessario effettuare il primo travaso,** per eliminare la morchia naturalmente sedimentata, limitandone così il contatto con l'olio. Si consiglia di effettuare il travaso evitando di mettere in circolo il sedimento.

Nella pianificazione della raccolta è opportuno tenere conto di diversi aspetti:

- andamento delle infestazioni e stato fitosanitario delle olive: per ottenere un **olio di qualità** è necessario frangere **olive in buono stato fitosanitario**;
- andamento della maturazione delle olive e del contenuto in olio: la maturazione delle olive influisce sulle **caratteristiche organolettiche dell'olio** prodotto; il contenuto in olio è indicativo della **resa potenziale al frantoio;**
- previsioni meteo (consultabili al link **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**): eventuali fasi di maltempo possono **interferire con le operazioni di raccolta**, prolungandone i tempi con eventuali conseguenze sullo stato fitosanitario del prodotto; l'idratazione delle olive a seguito di eventuali piogge può determinare l'abbassamento delle **rese percentuali** ed infine, eventuali eventi di forte intensità, purtroppo sempre più frequenti, potrebbero causare **cascola di prodotto**.

IMPERIA – bollettino n.23 del 15/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

ASPETTI FITOSANITARI IN RACCOLTA E POST RACCOLTA

L'impiego di scuotitori meccanici per la raccolta delle olive causa lesioni attraverso le quali possono diffondersi patologie batteriche, come la **rogna dell'olivo,** responsabile di gravi danni alle produzioni in molti areali provinciali. È necessario contrastarne la diffusione, operando in giornate asciutte, disinfettando le parti terminali degli scuotitori passando da una pianta all'altra (es. sali quaternari di ammonio) e, laddove il numero di piante colpite sia limitato, raccogliendo queste per ultime.

Subito dopo la raccolta è opportuno intervenire **con prodotti rameici**, utili anche per contrastare lo sviluppo delle principali patologie fungine quali, ad esempio, **l'occhio di pavone.**

Nel caso di **oliveti particolarmente colpiti da rogna,** è possibile abbinare al trattamento rameico anche concimi fogliari a base di rame e zinco (es. Dentamet); in tal caso, è consigliabile dimezzare le dosi di impiego di entrambi i prodotti. Maggiori informazioni nelle schede tecniche dedicate: **http://bit.ly/RL-olivo-patologie** e **http://bit.ly/RL-occhiopavone**

RESE AL FRANTOIO

Le scorsa settimana è stata caratterizzata da **precipitazioni abbondanti** in tutti gli areali regionali, che hanno determinato una progressiva **reidratazione delle olive**, tanto più marcata negli areali dove lo stress idrico era più grave. Le rese al frantoio ottenute nei giorni successivi possono pertanto risultare più basse, ed effettivamente così risulta dai dati registrati a livello regionale dagli olivicoltori attraverso il questionario, che evidenziano una riduzione delle rese medie di circa 4 punti percentuali rispetto al periodo precedente alle ultime precipitazioni.

Al fine di disporre di dati sempre aggiornati, si invitano i produttori a registrare le rese effettive ottenute al frantoio nelle varie frangiture attraverso il **questionario disponibile** al link **https://tinyurl.com/Registrazionerese26**.

Tutti i dati comunicati a livello regionale, utili per pianificare al meglio le operazioni di raccolta e aggiornati periodicamente, sono disponibili al seguente link: **https://tinyurl.com/Rese2026**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

IMPERIA – bollettino n.23 del 15/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA



L'attività di ovideposizione della mosca è aumentata e in diversi areali provinciali, le **infestazioni hanno raggiunto o superato la soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione integrata della Regione Liguria (5-7%),** risultano costituite in prevalenza da uova e in misura minore da larve di prima età.

Negli areali evidenziati in rosso in tabella è pertanto necessario **procedere alla raccolta delle olive entro un paio di settimane**, in modo da preservare lo stato fitosanitario del prodotto.

In alternativa alla raccolta anticipata, è possibile intervenire tempestivamente con prodotti ad azione larvicida.

Negli areali evidenziati in giallo in tabella, si segnalano **situazioni di allerta**, poiché, nonostante le infestazioni medie rilevate a inizio settimana siano risultate inferiori alla soglia, queste sono in continuo incremento e potrebbero risultare rapidamente superiori alla soglia. Previa verifica della situazione specifica del proprio oliveto in relazione all'incidenza delle infestazioni, anche in tali aree potrebbe essere opportuno seguire le indicazioni sopra riportate.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE	fascia	quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento		
 FASCIA 1 COSTA	INTERA FASCIA	Quota 0-200 m TRATTATO 8/10 o IN RACCOLTA		
 SCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	Quota 0-150 m TRATTATO 8/10 o IN RACCOLTA	Quota 150-250 m 5% TRATTARE o PREPARARSI ALLA RACCOLTA	Quota 250-350 m 6% TRATTARE o PREPARARSI ALLA RACCOLTA
	PONENTE	Quota 0-150 m TRATTATO 8/10 o IN RACCOLTA	Quota 150-250 m TRATTATO 8/10 o IN RACCOLTA	Quota 250-350 m 6% TRATTARE o PREPARARSI ALLA RACCOLTA
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	Quota 0-100 m 7% TRATTARE o PREPARARSI ALLA RACCOLTA	Quota 100-250 m 8% TRATTARE o PREPARARSI ALLA RACCOLTA	Quota 250-350 m 3% ALLERTA
	PONENTE	Quota 250-350 m 3% ALLERTA	Quota >350 4% ALLERTA	
 FASCIA 4 INTERNO	INTERA FASCIA	Fino a 250 m 7% TRATTARE o PREPARARSI ALLA RACCOLTA	Quota 250-350 m TRATTATO 8/10 o IN RACCOLTA	Quota >350 m 3% ALLERTA

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.**

Modalità di lettura dei dati disponibili nel comunicato n.7: https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot
Autorità di Gestione CSR Liguria

IMPERIA – bollettino n.23 del 15/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

È possibile utilizzare **flupyradifurone** (Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (per olive da olio: Kestrel i.s. 7 giorni o Epik SL i.s. 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità; per olive da mensa: Kestrel o Epik SL i.s. 28 giorni; max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità).

Per avere meno vincoli in fase di raccolta, si consiglia di prevedere l'impiego dei prodotti con intervallo di sicurezza più breve negli ultimi interventi, in relazione anche a possibili difficoltà organizzative dovute ad esempio a condizioni meteo avverse.

Relativamente all'impiego di tali prodotti, si ricorda che:

* devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non **appena rilevato l'avvio delle infestazioni**
* è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5)
* si consiglia di impiegare la dose massima consentita da etichetta
* prima della raccolta è necessario **rispettare l'intervallo di sicurezza riportato nell'etichetta del prodotto impiegato** e scartare il prodotto eventualmente caduto nelle reti prima che sia trascorso.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Raccolta anticipata delle olive

Si consiglia di procedere alla raccolta delle olive, al fine di salvaguardare lo stato fitosanitario delle olive e la qualità dell'olio prodotto, possibilmente verificando la situazione specifica del proprio oliveto.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicata **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

Maggiori informazioni sulla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot