LA SPEZIA – bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE



Prosegue la fase fenologica di ingrossamento dei frutti.

Le dimensioni delle olive risultano variabili e fortemente influenzate dalla persistente carenza idrica e dalle elevate temperature.


Si inizia a osservare la perdita di turgore delle olive, oltreché l'arricciamento delle foglie, riconducibili alle condizioni di siccità e all'elevato stress termico.


ANDAMENTO METEO

Pur rimanendo su valori elevati, le temperature massime hanno registrato una lieve diminuzione nel corso della settimana. Le precipitazioni sono risultate scarse tanto che nessuna stazione meteo provinciale ha registrato valori superiori ai 3 mm.

I grafici sotto riportati evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relative alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali.

Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**





>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE IDRICA

Le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 23 luglio evidenziano la **necessità di irrigare in tutti gli areali provinciali.**

Gli apporti idrici consigliati nelle diverse tipologie di terreno sono consultabili attraverso il consiglio irriguo della Regione Liguria: https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php).

>>> Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali.


>>> Prima di irrigare verificare le previsioni meteo: https://tinyurl.com/previsioniARPAL

>>> Le irrigazioni possono favorire l'attività di ovideposizione della mosca e l'aumento delle infestazioni

Qualora non sia possibile irrigare, oppure come misura complementare, **può risultare particolarmente utile l'impiego di corroboranti a base di polveri di roccia, quali caolino o zeolite**, impiegati in questa fase anche per la difesa preventiva nei confronti della mosca olearia.

La pellicola bianca che tali prodotti creano sulla vegetazione riduce infatti l'assorbimento della radiazione solare in eccesso, abbassando la temperatura di foglie e frutti e limitando i fenomeni di scottatura.

La riduzione di traspirazione ed evapotraspirazione favorisce il risparmio idrico e la migliore tolleranza della coltura ai periodi di caldo intenso e siccità. In alcuni casi per aumentare la persistenza e l'uniformità della copertura, può essere utile l'associazione a specifici bagnanti-adesivanti.



LA SPEZIA – bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA

Le attuali condizioni climatiche continuano a risultare sfavorevoli all'attività di ovideposizione e allo sviluppo larvale e le infestazioni attive risultano generalmente assenti. Quelle rilevate, risultano costituite in prevalenza da uova e giovani larve e sono caratterizzate da elevata mortalità.

Alla quota più bassa di fascia 1 ponente, dove la scorsa settimana era stata evidenziata una **situazione di allerta**, l'infestazione risulta efficacemente contenuta dalla **mortalità da caldo**, la cui stima può essere effettuata impiegando il modello (https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php).

Situazioni anomale possono tuttavia verificarsi in oliveti irrigui e negli oliveti con drupe ben idratate, dove si consiglia di verificare l'effettiva incidenza di olive che presentano punture di ovideposizione e stimare il contributo della mortalità attraverso l'impiego del modello.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 – 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	NON TRATTARE (0%)		NON TRATTARE (1%)
	PONENTE	NON TRATTARE (5%)		—
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (4%)
	PONENTE	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (0%)
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (0%)		NON TRATTARE (0%)
	PONENTE	NON TRATTARE (0%)		NON TRATTARE (0%)

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.**

Per conoscere la fascia e la quota del proprio oliveto e individuare la cella della tabella cui fare riferimento è possibile consultare lo strumento "visualizzatore" all'indirizzo https://sia.regione.liguria.it/apps/sia/Fasce

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Esche proteiche

Coloro che le stanno impiegando per contenere le popolazioni delle prime generazioni estive di mosca, devono proseguire gli interventi secondo quanto previsto dall'etichetta del prodotto impiegato, per dosi e modalità d'impiego.

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO), che richiedono l'impiego di bassi volumi d'acqua perché vanno distribuiti solo su una porzione di chioma o a spot.

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida**.

Soltanto in casi particolari le infestazioni potrebbero aver raggiunto valori tali da richiedere l'impiego di tali prodotti. Previa verifica dell'incidenza delle infestazioni e del superamento della soglia di intervento è possibile impiegare i prodotti riportati nelle schede tecniche dedicate.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Mantenere la copertura e rinnovarla tempestivamente a seguito di eventuali piogge dilavanti, poiché le condizioni immediatamente successive a tali eventi sono quelle maggiormente favorevoli alle ovideposizioni. A seconda del prodotto impiegato è possibile impiegare adesivanti che migliorano la resistenza al dilavamento.

Trappole del tipo "attract and kill"

Prevedere verifiche della cattura di esemplari di mosca dell'olivo e dell'andamento delle infestazioni, in particolare quando i bollettini ne segnaleranno l'aumento.

Tali tecniche, consigliate anche in produzione integrata, possono contribuire al contenimento delle infestazioni nel periodo estivo e possono essere integrate al bisogno con altre tecniche e tipologie di prodotto ammesse.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**