LA SPEZIA – bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)


SITUAZIONE ATTUALE

Dal punto di vista fenologico, nelle aree litoranee e di prima collina si rileva l'inizio della fase di maturazione (BBCH 80), nella quale le olive cambiano di colore da verde cupo a verde chiaro giallastro.

Sono sempre più estesi ed evidenti i sintomi a carico di frutti e foglie causati dal perdurare di condizioni di elevato stress termico e idrico. Limitatamente ad alcuni oliveti di prima collina è stata rilevata anche una riduzione della resistenza al distacco del picciolo in olive sane, potenzialmente correlata a cascola.

ANDAMENTO METEO

Le temperature hanno subito un ulteriore aumento negli ultimi giorni e le precipitazioni sono risultate assenti. Il grafico sotto riportato evidenzia l'andamento settimanale delle temperature massime relative alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Negli ultimi 7 giorni non sono state registrate precipitazioni significative in nessuna stazione meteo provinciale e non si riporta pertanto il relativo grafico. Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**



>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori dettagli nel Decreto al link **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE IDRICA


Le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 13 agosto evidenziano la **necessità di irrigare in tutti gli areali provinciali. Attenzione tuttavia alle previsioni meteo.**


>>> Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali

>>> Prima di irrigare verificare le previsioni meteo: https://tinyurl.com/previsioniARPAL

>>> Le irrigazioni possono favorire l'attività di ovideposizione della mosca

Gli apporti idrici consigliati nelle diverse tipologie di terreno sono consultabili attraverso il consiglio irriguo della Regione Liguria: https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php).





REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA

Anche questa settimana le condizioni climatiche sono risultate particolarmente sfavorevoli all'attività della mosca olearia. Le olive mostrano attualmente uno stato fitosanitario eccellente. Laddove si sono verificate ovideposizioni, la mortalità larvale rilevata nei campioni è risultata pressoché totale (modello di stima disponibile al link: **https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php**).

Non risulta un avvio significativo della seconda generazione estiva di mosca e le infestazioni attive risultano ovunque inferiori alla soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria.

Situazioni anomale possono verificarsi limitatamente a oliveti irrigui con drupe ben idratate.

Attenzione alle precipitazioni previste per l'inizio della prossima settimana

Le condizioni potrebbero risultare immediatamente favorevoli all'attività della mosca. In caso di precipitazioni significative e abbassamento delle temperature, prestare attenzione al prossimo comunicato e **prepararsi a intervenire tempestivamente.** Si ricorda infatti che i prodotti ad azione larvicida disponibili sono efficaci sulle forme larvali giovani e pertanto è necessario intervenire all'avvio delle infestazioni.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 – 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	NON TRATTARE (1%)		NON TRATTARE (0%)
	PONENTE	NON TRATTARE (1%)		—
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (4%)
	PONENTE	NON TRATTARE (3%)	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (0%)
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (1%)		NON TRATTARE (0%)
	PONENTE	NON TRATTARE (0%)		NON TRATTARE (1%)

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.**

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: **https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida,** ma potrebbe essere necessario intervenire tempestivamente al mutare delle condizioni climatiche.

Si ricorda che tali prodotti devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non **appena rilevato l'avvio delle infestazioni**. Si ricorda inoltre che è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5) e utilizzare la dose massima consentita da etichetta. La miscela con concimi fogliari o biostimolanti può favorire l'assorbimento del prodotto e migliorarne l'efficacia.

Esche proteiche

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO).

Coloro che le stanno impiegando possono continuare a farlo secondo i limiti e le indicazioni riportate in etichetta, ma in caso di avvio rilevante delle infestazioni si consiglia di prevedere l'impiego di prodotti ad azione larvicida.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Mantenere la copertura e ripristinarla tempestivamente in caso di piogge dilavanti, considerando tuttavia che il periodo successivo al ferragosto è generalmente più favorevole all'attività della mosca olearia e caratterizzato da infestazioni più rilevanti. In tali situazioni, valutare la possibilità di integrare tale tecnica con l'impiego di esche proteiche o prodotti ad azione larvicida consentiti in BIO (es. Oikos)

Azadircatina A (Oikos)

Si tratta di un prodotto di origine naturale da impiegarsi all'avvio delle ovideposizioni e da ripetersi a distanza di circa 7-10 giorni dal precedente fino a un massimo di 3 volte.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot