LA SPEZIA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE



Fascia 1 levante, quota 300m, cv *Pignola*

Prosegue la maturazione delle olive, evidente soprattutto dall'osservazione della polpa, che appare giallastra e ricca di olio nei campioni prelevati in tutti gli areali provinciali.

Dal punto di vista fenologico la fase prevalente risulta sempre la BBCH 81, ma un numero sempre maggiore di olive delle principali varietà ha assunto la colorazione tipica della varietà, raggiungendo la fase BBCH 85. Più arretrata la maturazione nella ***castelnovina***, nella quale prevale ancora la colorazione verde giallastra dell'epidermide. La variabilità può tuttavia essere elevata, non solo tra diversi areali, ma anche tra oliveti dello stesso areale, in funzione soprattutto della carica produttiva.

Anche laddove le infestazioni da mosca sono iniziate da diverse settimane, lo stato fitosanitario delle olive risulta ancora ottimale, ma in alcuni oliveti delle aree litoranee l'incidenza delle infestazioni dannose è in aumento e inizia a manifestarsi cascola di olive colpite.

Considerate le rese stimate, quelle reali comunicate dagli olivicoltori e dai frantoiani, laddove siano presenti infestazioni e non siano stati eseguiti gli interventi nelle tempistiche indicate, **si consiglia di procedere alla raccolta delle olive**.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

BUONE PRATICHE DI RACCOLTA DELLE OLIVE E CONSERVAZIONE DELL'OLIO

È importante **raccogliere le olive direttamente dalla pianta** e scartare quelle cadute a terra o in cattivo stato fitosanitario, avendo cura di riporre il prodotto in strati sottili e in cassette forate possibilmente in locali freschi, ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento e lontano da odori sgradevoli.

Si consiglia inoltre di **prendere accordi con il frantoio prima della raccolta**, prenotando la frangitura, in modo da **effettuare la molitura delle olive prima possibile** (possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta). Per preservare le caratteristiche dell'olio prodotto è importante **utilizzare contenitori in acciaio** o **vetro scuro**, **privi di odori, puliti** (con acqua calda e bicarbonato di sodio) **e asciutti e mantenerli colmi** al fine di limitare il contatto tra olio e aria. **I locali** di stoccaggio devono essere **asciutti e privi di odori con temperature ottimali comprese tra i 12 e i 16 °C.** Dopo 15-20 giorni in caso di olio non filtrato **è necessario effettuare il primo travaso,** per eliminare la morchia naturalmente sedimentata, limitandone così il contatto con l'olio. Si consiglia di effettuare il travaso evitando di mettere in circolo il sedimento.

Nella pianificazione della raccolta è opportuno tenere conto di diversi aspetti:

- andamento delle infestazioni e stato fitosanitario delle olive: per ottenere un **olio di qualità** è necessario frangere **olive in buono stato fitosanitario**;
- andamento della maturazione delle olive e del contenuto in olio: la maturazione delle olive influisce sulle **caratteristiche organolettiche dell'olio** prodotto; il contenuto in olio è indicativo della **resa potenziale al frantoio;**
- previsioni meteo (consultabili al link **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**): eventuali fasi di maltempo possono **interferire con le operazioni di raccolta**, prolungandone i tempi con eventuali conseguenze sullo stato fitosanitario del prodotto; l'idratazione delle olive a seguito di eventuali piogge può determinare l'abbassamento delle **rese percentuali** ed infine, eventuali eventi di forte intensità, purtroppo sempre più frequenti, potrebbero causare **cascola di prodotto**.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

ASPETTI FITOSANITARI IN RACCOLTA E POST RACCOLTA

L'impiego di scuotitori meccanici per la raccolta delle olive causa lesioni attraverso le quali possono diffondersi patologie batteriche, come la **rogna dell'olivo,** responsabile di gravi danni alle produzioni in molti areali provinciali. È necessario contrastarne la diffusione, operando in giornate asciutte, disinfettando le parti terminali degli scuotitori passando da una pianta all'altra (es. sali quaternari di ammonio) e, laddove il numero di piante colpite sia limitato, raccogliendo queste per ultime.

Subito dopo la raccolta è opportuno intervenire **con prodotti rameici**, utili anche per contrastare lo sviluppo delle principali patologie fungine quali, ad esempio, **l'occhio di pavone.**

Nel caso di **oliveti particolarmente colpiti da rogna,** è possibile abbinare al trattamento rameico anche concimi fogliari a base di rame e zinco (es. Dentamet); in tal caso, è consigliabile dimezzare le dosi di impiego di entrambi i prodotti. Maggiori informazioni nelle schede tecniche dedicate: http://bit.ly/RL-olivo-patologie e http://bit.ly/RL-occhiopavone

RESE AL FRANTOIO

Grazie alle informazioni comunicate dai frantoiani e grazie agli olivicoltori che hanno compilato il questionario, questa settimana sono **disponibili anche i primi dati relativi alle rese ottenute nelle prime frangiture** effettuate in provincia. Le rese al frantoio registrate in provincia risultano generalmente superiori rispetto a quelle stimate a partire dai dati di inolizione, risultando comprese tra 11,3% e 18,7%.

La differenza tra rese ipotetiche stimate a partire dai dati di inolizione e quelle reali registrate può essere attribuita, oltre che all'approccio cautelativo adottato per la stima, anche all'aspetto varietale, poiché la maggior parte dei dati disponibili sono relativi alle cultivar ***frantoio/razzola.***

Al fine di disporre di dati sempre aggiornati, si invitano i produttori a registrare le rese effettive ottenute al frantoio nelle varie frangiture attraverso il **questionario disponibile** al link https://tinyurl.com/Registrazionerese26. **Tutti i dati comunicati a livello regionale**, utili per pianificare al meglio le operazioni di raccolta e aggiornati periodicamente, sono disponibili al seguente link: **https://tinyurl.com/Rese2026**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

ANDAMENTO DEL CONTENUTO IN OLIO

Comune oliveto	Varietà	Quota	Sostanza grassa su fresco %	Sostanza grassa su secco %	Resa al frantoio prevista %
Riomaggiore	Pignola	250	20.5	36.88	**13.53**
Riomaggiore	Razzola	250	24.02	45.4	**15.85**
Levanto	Pignola	60	20.89	42.84	**13.79**
Sarzana	Miste	20	16.6	37.04	**10.96**
Sarzana	Castelnovina	20	18	36.33	**11.88**
Sarzana	Miste	10	13.66	32.07	**9.02**
Levanto	Razzola	170	22.15	40.88	**14.62**
Santo Stefano di Magra	Miste	50	13.56	29.95	**8.95**
Santo Stefano di Magra	Miste	30	12.87	31.46	**8.49**
Santo Stefano di Magra	Razzola	110	15.91	36.87	**10.50**
Bolano	Frantoio	170	18.42	39.95	**12.16**
Luni	Miste	20	20.94	40.35	**13.82**
	MEDIA		**18.13**	**37.50**	**11.96**

Dati del 05/10/2026. I dati relativi all'intero territorio regionale sono disponibili al link: https://tinyurl.com/inolizione2026

Per l'ultima settimana vengono proposte le **determinazioni del contenuto in olio,** condotte presso il **Laboratorio regionale di Sarzana** allo scopo di fornire indicazioni sullo stato di maturazione delle olive e utili per pianificare le raccolte. **Il contenuto medio in olio espresso sul peso fresco è risultato in linea con quello rilevato la scorsa settimana (media 18,1%, min 12,8%, max 24% e possibili rese al frantoio comprese tra 8,5% e 15,8%).** I valori su fresco continuano a risultare mediamente superiori a quelli della stessa settimana del 2025: questa settimana la differenza è di circa 2 punti percentuali. **Il contenuto medio in olio espresso sul peso secco,** (valore non influenzato dall'idratazione delle olive e utile per valutare il progresso del processo di inolizione) **è risultato essere 37,5%, in linea con quello della settimana scorsa e** superiore a quello della stessa settimana del 2025 di circa 4 punti percentuali.

E' opportuno ricordare che la maturazione delle olive e l'accumulo in olio dipendono da molti fattori (es. idratazione delle olive, varietà, microclima, tecnica di coltivazione, carica produttiva) per cui la variabilità tra un oliveto e l'altro può essere molto elevata, e che **la resa non è un parametro di qualità dell'olio**.

RESE AL FRANTOIO

Al fine di monitorare l'andamento della maturazione, si invitano i produttori a registrare le rese effettive ottenute al frantoio nelle varie frangiture al link https://tinyurl.com/Registrazionerese26

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA

A seguito di interventi con prodotti ad azione larvicida, i campionamenti per rilevare l'andamento delle infestazioni sono ripresi negli oliveti interessati a distanza di almeno 15 giorni.

In tutti gli areali provinciali, compresi gli oliveti in uscita dai trattamenti consigliati il 17 settembre, l'attività della mosca olearia è risultata in aumento e le infestazioni attive sono risultate superiori alla **soglia di intervento prevista dal Disciplinare di produzione integrata della Regione Liguria (5-7%).**

Considerato lo stato fitosanitario delle olive, l'andamento della maturazione e le buone rese al frantoio, si consiglia:

- **laddove non sono stati eseguiti trattamenti**, di procedere tempestivamente alla raccolta
- **laddove gli interventi consigliati sono stati eseguiti secondo le tempistiche indicate,** di pianificare la raccolta in funzione dello stato fitosanitario delle olive, rispettando sempre l'intervallo di sicurezza dei prodotti impiegati. Negli areali evidenziati in arancione in tabella, in alternativa alla raccolta, è possibile eseguire un ulteriore intervento, ma considerato quanto sopra questa opzione non è consigliata.

<table>
<tr><th colspan="5">LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE</th></tr>
<tr><th>ZONE</th><th></th><th>0 - 100 m
Inf. Attiva (%)</th><th>100 - 200 m
Inf. Attiva (%)</th><th>200 – 350 m
Inf. Attiva (%)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">
FASCIA 1
COSTA</td><td>LEVANTE</td><td colspan="2">PROCEDERE ALLA RACCOLTA</td><td>TRATTATO 01/10
o IN RACCOLTA</td></tr>
<tr><td>PONENTE</td><td colspan="2">PROCEDERE ALLA RACCOLTA</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">
FASCIA 2
PRIMO ENTROTERRA</td><td>LEVANTE</td><td>TRATTATO 24/09
o IN RACCOLTA</td><td colspan="2">PROCEDERE ALLA RACCOLTA</td></tr>
<tr><td>PONENTE</td><td colspan="2">PROCEDERE ALLA RACCOLTA</td><td>TRATTATO 24/09
o IN RACCOLTA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">
FASCIA 3
ENTROTERRA</td><td>LEVANTE</td><td colspan="3">TRATTATO 24/09 o IN RACCOLTA</td></tr>
<tr><td>PONENTE</td><td colspan="3">TRATTATO 24/09 o IN RACCOLTA</td></tr>
</table>

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L.**

Modalità di lettura dei dati disponibili nel comunicato n.7: https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

È possibile utilizzare **flupyradifurone** (Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (per olive da olio: Kestrel i.s. 7 giorni o Epik SL i.s. 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità; per olive da mensa: Kestrel o Epik SL i.s. 28 giorni; max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità).

Per avere meno vincoli in fase di raccolta, si consiglia di prevedere l'impiego dei prodotti con intervallo di sicurezza più breve negli ultimi interventi, in relazione anche a possibili difficoltà organizzative dovute ad esempio a condizioni meteo avverse.

Relativamente all'impiego di tali prodotti, si ricorda che:

* devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non **appena rilevato l'avvio delle infestazioni**
* è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5)
* si consiglia di impiegare la dose massima consentita da etichetta
* prima della raccolta è necessario **rispettare l'intervallo di sicurezza riportato nell'etichetta del prodotto impiegato** e scartare il prodotto eventualmente caduto nelle reti prima che sia trascorso.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Raccolta anticipata delle olive

Si consiglia di procedere alla raccolta delle olive all'apertura dei frantoi, al fine di salvaguardare lo stato fitosanitario delle olive e la qualità dell'olio prodotto, possibilmente verificando la situazione specifica del proprio oliveto.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicata **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

Maggiori informazioni sulla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

LA SPEZIA – bollettino n.22 del 08/10/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

CECIDOMIA DELL'OLIVO

È in corso la generazione autunnale in tutti gli areali provinciali interessati dalla presenza dell'insetto.



In oliveti irrigati nel corso dell'estate, dove l'emissione della nuova vegetazione è iniziata in anticipo rispetto a quanto osservato in oliveti non irrigui, è già possibile osservare le galle neoformate.

Generalmente non si consiglia di effettuare interventi specifici in questa fase, sia perché sta per iniziare la fase di raccolta, sia perché lo sfarfallamento riguarda un numero limitato di esemplari (circa il 15-20%) e la scalarità delle ovideposizioni rende particolarmente difficile intervenire efficacemente.

Tuttavia, poiché eventuali interventi con prodotti ad azione larvicida effettuati in questa fase contro la mosca olearia possono contribuire a contenere anche le infestazioni da cecidomia e limitarne i relativi danni, negli areali interessati, a coloro che li eseguono, si consiglia di **preferire prodotti a base di flupyradifurone** (Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni), che ha mostrato miglior efficacia contro tale parassita.

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot