SAVONA – bollettino n.10 del 16/07/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)


SITUAZIONE ATTUALE


Le principali varietà hanno raggiunto l'indurimento del nocciolo nella maggior parte degli areali olivicoli provinciali. Le dimensioni delle olive sono variabili e particolarmente influenzate dalla carenza idrica che determina anche raggrinzimento delle drupe e i primi sintomi sulle foglie, che iniziano a perdere colorazione e ripiegare i margini fogliari.

La **cascola fisiologica e quella riconducibile all'elevato stress termico e idrico sono risultate generalmente limitate e la carica produttiva si conferma da media a medio-buona.**

ANDAMENTO METEO

Le condizioni meteo dell'ultima settimana sono state caratterizzate da temperature massime ancora elevate e precipitazioni limitate ad alcuni areali. I grafici sotto riportati evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relative alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**






>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

SAVONA– bollettino n.10 del 16/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE IDRICA



Le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 16 luglio evidenziano la **necessità di irrigare in tutti gli areali provinciali**.

Gli apporti idrici consigliati nelle diverse tipologie di terreno sono consultabili attraverso il consiglio irriguo della Regione Liguria: https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php).

L'immagine sotto riporta l'esempio del consiglio per la tipologia di terreno a medio impasto.

Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali.

Qualora non sia possibile irrigare, oppure come misura complementare per ridurre il consumo idrico, **può risultare particolarmente utile l'impiego di corroboranti a base di polveri di roccia, quali caolino o zeolite**, consigliati in questa fase anche per la difesa preventiva nei confronti della mosca olearia.

La pellicola bianca che tali prodotti creano sulla vegetazione riduce infatti l'assorbimento della radiazione solare in eccesso, abbassando la temperatura di foglie e frutti e limitando i fenomeni di scottatura.

La riduzione di traspirazione ed evapotraspirazione favorisce il risparmio idrico e la migliore tolleranza della coltura ai periodi di caldo intenso e siccità. In alcuni casi per aumentare la persistenza e l'uniformità della copertura, può essere utile l'associazione a specifici bagnanti-adesivanti.

SAVONA– bollettino n.10 del 16/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)


SITUAZIONE MOSCA

Dai rilievi settimanali è emersa la presenza di attacchi limitati, che determinano la presenza di infestazioni attive caratterizzate dalla presenza di uova e larve di prima età.

La presenza di infestazioni attive continua a risultare tuttavia prevalentemente assente, grazie alle elevate temperature che continuano a determinare condizioni **sfavorevoli all'avvio delle infestazioni**.

Eventuali situazioni anomale potrebbero verificarsi in oliveti con olive ben sviluppate e idratate, in versanti più freschi o in oliveti irrigui.

In tali contesti si consiglia di verificare l'effettiva incidenza di olive che presentano punture di ovideposizione e l'eventuale incidenza della **mortalità da caldo** (stimabile attraverso il modello disponibile al link https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php).

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE		0-100 m Inf. Attiva (%)	100-200 m Inf. Attiva (%)	200–350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (2%)	—
	PONENTE	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (0%)	—
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (NON RILEVATO)
	PONENTE	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (2%)
 FASCIA 3 ENTROTERRA	INTERA FASCIA	NON TRATTARE (NON RILEVATO)		NON TRATTARE (0%)

Per conoscere la fascia e la quota del proprio oliveto e individuare la cella della tabella cui fare riferimento è possibile consultare lo strumento "visualizzatore" all'indirizzo https://sia.regione.liguria.it/apps/sia/Fasce

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

SAVONA– bollettino n.10 del 16/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Mantenere la copertura e rinnovarla tempestivamente a seguito di eventuali piogge dilavanti, poiché le condizioni immediatamente successive a tali eventi sono quelle maggiormente favorevoli alle ovideposizioni. A seconda del prodotto impiegato è possibile impiegare adesivanti che migliorano la resistenza al dilavamento.

Trappole del tipo "attract and kill"

Le trappole sono già state posizionate negli oliveti. Si consiglia di prevedere verifiche della cattura di esemplari di mosca dell'olivo e dell'andamento delle infestazioni, in particolare quando i bollettini ne segnaleranno l'aumento.

Tali tecniche, consigliate anche in produzione integrata, possono contribuire al contenimento delle infestazioni nel periodo estivo e possono essere integrate al bisogno con altre tecniche e tipologie di prodotto ammesse.

PRODUZIONE INTEGRATA

Esche proteiche

Coloro che le impiegano per contenere le popolazioni delle prime generazioni estive di mosca, prevedendo l'impiego di prodotti ad azione larvicida a fine estate-inizio autunno, **devono iniziare o proseguire gli interventi secondo quanto previsto dall'etichetta del prodotto impiegato, per dosi e modalità d'impiego.**

A coloro che, nel corso della stagione, non prevedono l'impiego di prodotti ad azione larvicida, si consiglia di preferirne l'impiego in una fase successiva di maggior pressione della mosca, **attuando in questa fase preferibilmente le soluzioni descritte per l'agricoltura biologica**.

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO), che richiedono l'impiego di bassi volumi d'acqua perché vanno distribuiti solo su una porzione di chioma o a spot.

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida.**

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot