SAVONA – bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)


SITUAZIONE ATTUALE




La fase fenologica di indurimento del nocciolo è stata raggiunta in tutti gli areali olivicoli provinciali e prosegue lo sviluppo della polpa, anche se in quasi tutti gli oliveti monitorati si osserva la perdita di turgore delle olive, oltreché l'arricciamento delle foglie, riconducibili alle condizioni di siccità e all'elevato stress termico.

ANDAMENTO METEO

Le temperature massime hanno registrato un lieve aumento rispetto alla settimana scorsa e le precipitazioni sono risultate scarse. I grafici sotto riportati evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relative alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**





>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto: **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriliguriarnet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriliguriarnet Telegram: CAARserviziBot

SAVONA– bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE IDRICA

Le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 23 luglio evidenziano la **necessità di irrigare in quasi tutti gli areali provinciali.**

Gli apporti idrici consigliati nelle diverse tipologie di terreno sono consultabili attraverso il consiglio irriguo della Regione Liguria: https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php).

>>> Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali.


>>> Prima di irrigare verificare le previsioni meteo: https://tinyurl.com/previsioniARPAL

>>> Le irrigazioni possono favorire l'attività di ovideposizione della mosca e l'aumento delle infestazioni

Qualora non sia possibile irrigare, oppure come misura complementare, **può risultare particolarmente utile l'impiego di corroboranti a base di polveri di roccia, quali caolino o zeolite**, impiegati in questa fase anche per la difesa preventiva nei confronti della mosca olearia.

La pellicola bianca che tali prodotti creano sulla vegetazione riduce infatti l'assorbimento della radiazione solare in eccesso, abbassando la temperatura di foglie e frutti e limitando i fenomeni di scottatura.

La riduzione di traspirazione ed evapotraspirazione favorisce il risparmio idrico e la migliore tolleranza della coltura ai periodi di caldo intenso e siccità. In alcuni casi per aumentare la persistenza e l'uniformità della copertura, può essere utile l'associazione a specifici bagnanti-adesivanti.




REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

SAVONA– bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA




Dai rilievi settimanali emerge che l'attività della mosca olearia è stata pressochè assente e le infestazioni attive, dove riscontrate, risultano ampiamente inferiori alla soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria.

Situazioni anomale possono tuttavia verificarsi in oliveti irrigui e negli oliveti con drupe ben idratate.

In tali situazioni si raccomanda di **monitorare attentamente le infestazioni**, verificando l'effettiva incidenza di olive che presentano punture di ovideposizione e stimando il contributo della mortalità attraverso l'impiego del modello.

Il grafico riporta i dati di **mortalità da caldo** stimati dal modello (https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php) per alcune stazioni meteo provinciali e relativi agli ultimi 7 giorni.

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE		0-100 m Inf. Attiva (%)	100-200 m Inf. Attiva (%)	200–350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (0%)	—-
	PONENTE	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (2%)	—-
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (NON RILEVATO)
	PONENTE	NON TRATTARE (2%)	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (0%)
 FASCIA 3 ENTROTERRA	INTERA FASCIA	NON TRATTARE (0%)		NON TRATTARE (0%)

Per conoscere la fascia e la quota del proprio oliveto e individuare la cella della tabella cui fare riferimento è possibile consultare lo strumento "visualizzatore" all'indirizzo https://sia.regione.liguria.it/apps/sia/Fasce

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

SAVONA– bollettino n.11 del 23/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Esche proteiche

Coloro che le stanno impiegando per contenere le popolazioni delle prime generazioni estive di mosca, devono proseguire gli interventi secondo quanto previsto dall'etichetta del prodotto impiegato, per dosi e modalità d'impiego.

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO), che richiedono l'impiego di bassi volumi d'acqua perché vanno distribuiti solo su una porzione di chioma o a spot.

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida**.

Soltanto in casi particolari le infestazioni potrebbero aver raggiunto valori tali da richiedere l'impiego di tali prodotti. Previa verifica dell'incidenza delle infestazioni e del superamento della soglia di intervento è possibile impiegare i prodotti riportati nelle schede tecniche dedicate.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Mantenere la copertura e rinnovarla tempestivamente a seguito di eventuali piogge dilavanti, poiché le condizioni immediatamente successive a tali eventi sono quelle maggiormente favorevoli alle ovideposizioni. A seconda del prodotto impiegato è possibile impiegare adesivanti che migliorano la resistenza al dilavamento.

Trappole del tipo "attract and kill"

Prevedere verifiche della cattura di esemplari di mosca dell'olivo e dell'andamento delle infestazioni, in particolare quando i bollettini ne segnaleranno l'aumento.

Tali tecniche, consigliate anche in produzione integrata, possono contribuire al contenimento delle infestazioni nel periodo estivo e possono essere integrate al bisogno con altre tecniche e tipologie di prodotto ammesse.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot