# SAVONA – bollettino n.12 del 30/07/2026

# Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)


## SITUAZIONE ATTUALE


L'ingrossamento dei frutti è particolarmente influenzato dalle elevate temperature e dalla persistente carenza idrica, solo parzialmente mitigata negli areali interessati da precipitazioni.

Nella maggior parte degli oliveti monitorati, a eccezione di quelli irrigui, continuano a manifestarsi i sintomi di stress idrico già osservati nelle scorse settimane. In particolare, si rilevano il persistente arricciamento delle foglie e la riduzione del turgore delle drupe, fenomeni riconducibili al perdurare delle condizioni di siccità e alle elevate temperature che stanno interessando il territorio.

## ANDAMENTO METEO

Le temperature massime hanno registrato un notevole aumento negli ultimi giorni, raggiungendo valori molto elevati, e le precipitazioni sono risultate significative solo in limitati areali provinciali. I grafici sotto riportati evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relative alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**




>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto: **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

# SAVONA– bollettino n.12 del 30/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

## SITUAZIONE IDRICA

Le recenti precipitazioni hanno ripristinato solo parzialmente le riserve idriche e le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 30 luglio evidenziano la **necessità di irrigare in tutti gli areali provinciali.**

Gli apporti idrici consigliati nelle diverse tipologie di terreno sono consultabili attraverso il consiglio irriguo della Regione Liguria: https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php).

**>>> Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali.**


**>>> Prima di irrigare verificare le previsioni meteo**: https://tinyurl.com/previsioniARPAL

**>>> Le irrigazioni possono favorire l'attività di ovideposizione della mosca e l'aumento delle infestazioni**

Qualora non sia possibile irrigare, oppure come misura complementare, **può risultare particolarmente utile l'impiego di corroboranti a base di polveri di roccia, quali caolino o zeolite**, impiegati in questa fase anche per la difesa preventiva nei confronti della mosca olearia.

La pellicola bianca che tali prodotti creano sulla vegetazione riduce infatti l'assorbimento della radiazione solare in eccesso, abbassando la temperatura di foglie e frutti e limitando i fenomeni di scottatura.

La riduzione di traspirazione ed evapotraspirazione favorisce il risparmio idrico e la migliore tolleranza della coltura ai periodi di caldo intenso e siccità. In alcuni casi per aumentare la persistenza e l'uniformità della copertura, può essere utile l'associazione a specifici bagnanti-adesivanti.



# SAVONA– bollettino n.12 del 30/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

## SITUAZIONE MOSCA


Perdurano condizioni climatiche sfavorevoli all'attività di ovideposizione e allo sviluppo larvale e tali da determinare elevata incidenza della mortalità da caldo (modello di stima disponibile al link https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php).

**Dai rilievi settimanali emerge che l'attività della mosca olearia è stata pressochè assente** e le infestazioni attive, dove riscontrate, risultano ampiamente inferiori alla soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria.

**Il rischio pertanto rimane molto basso**.

La pressione della mosca olearia potrà aumentare a seguito di un cambiamento delle condizioni climatiche, con abbassamento delle temperature o, in particolare, a seguito di precipitazioni rilevanti.

**Situazioni anomale possono tuttavia verificarsi in oliveti irrigui e negli oliveti più freschi e con drupe ben idratate**, dove si consiglia di verificare l'effettiva incidenza di olive che presentano punture di ovideposizione e stimare il contributo della mortalità attraverso l'impiego del modello.

| LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONE | | 0-100 m<br>Inf. Attiva (%) | 100-200 m<br>Inf. Attiva (%) | 200–350 m<br>Inf. Attiva (%) |
|  FASCIA 1 COSTA | LEVANTE | NON TRATTARE (0%) | NON TRATTARE (3%) | — |
| | PONENTE | NON TRATTARE (0%) | NON TRATTARE (0%) | — |
|  FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA | LEVANTE | NON TRATTARE (2%) | NON TRATTARE (4%) | NON TRATTARE (0%) |
| | PONENTE | NON TRATTARE (3%) | NON TRATTARE (0%) | NON TRATTARE (2%) |
|  FASCIA 3 ENTROTERRA | INTERA FASCIA | NON TRATTARE (0%) | | NON TRATTARE (0%) |

Per conoscere la fascia e la quota del proprio oliveto e individuare la cella della tabella cui fare riferimento è possibile consultare lo strumento "visualizzatore" all'indirizzo https://sia.regione.liguria.it/apps/sia/Fasce

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

## SAVONA– bollettino n.12 del 30/07/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

# DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

### PRODUZIONE INTEGRATA

**Esche proteiche**

**Coloro che le stanno impiegando per contenere le popolazioni delle prime generazioni estive di mosca, devono proseguire gli interventi secondo quanto previsto dall'etichetta del prodotto impiegato, per dosi e modalità d'impiego.**

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO), che richiedono l'impiego di bassi volumi d'acqua perché vanno distribuiti solo su una porzione di chioma o a spot.

**Prodotti ad azione larvicida**

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida**.

### AGRICOLTURA BIOLOGICA

**Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)**

Mantenere la copertura e rinnovarla tempestivamente a seguito di eventuali piogge dilavanti, poiché le condizioni immediatamente successive a tali eventi sono quelle maggiormente favorevoli alle ovideposizioni. A seconda del prodotto impiegato è possibile impiegare adesivanti che migliorano la resistenza al dilavamento.

**Trappole del tipo "attract and kill"**

Prevedere verifiche della cattura di esemplari di mosca dell'olivo e dell'andamento delle infestazioni, in particolare quando i bollettini ne segnaleranno l'aumento.

**Tali tecniche, consigliate anche in produzione integrata**, possono contribuire al contenimento delle infestazioni nel periodo estivo e possono essere integrate al bisogno con altre tecniche e tipologie di prodotto ammesse.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**