SAVONA – bollettino n.14 del 13/08/2026


Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE

Nelle aree litoranee e di primo entroterra si rileva l'inizio della fase di maturazione (BBCH 80), con il progressivo viraggio del colore delle olive verso tonalità verde chiaro-giallastro. La persistente siccità continua a pesare sugli oliveti non irrigui, accentuando i sintomi di sofferenza: le foglie perdono turgore, si arricciano e assumono una colorazione grigiastra, mentre le drupe mostrano evidenti segni di raggrinzimento.

ANDAMENTO METEO

Le temperature massime rimangono su valori molto alti. Il grafico sotto riportato evidenzia l'andamento settimanale delle temperature massime relative alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali.



Negli ultimi 7 giorni non sono state registrate precipitazioni significative in nessuna stazione meteo provinciale e non si riporta pertanto il relativo grafico.

Previsioni meteo disponibili al link: **https://tinyurl.com/previsioniARPAL**

>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori dettagli nel Decreto: **protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

SAVONA– bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE IDRICA

Le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 13 agosto evidenziano la **necessità di irrigare in tutti gli areali provinciali.**


>>> Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali

>>> Prima di irrigare verificare le previsioni meteo: https://tinyurl.com/previsioniARPAL

>>> Le irrigazioni possono favorire l'attività di ovideposizione della mosca

Gli apporti idrici consigliati nelle diverse tipologie di terreno sono consultabili attraverso il consiglio irriguo della Regione Liguria: https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php).





REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

SAVONA– bollettino n.14 del 13/08/2026



Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE MOSCA

Le condizioni climatiche sono risultate ancora sfavorevoli all'attività della mosca olearia e le infestazioni risultano assenti nella maggior parte del territorio provinciale.

Si segnala tuttavia una **situazione di allerta in fascia 2 levante,** dove le infestazioni attive hanno infatti raggiunto la **soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria**. Sebbene sia dunque possibile intervenire con prodotti ad azione larvicida, considerata la composizione delle infestazioni e la mortalità rilevata nei campioni e stimata dal modello (**https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php**), non si consiglia di trattare, ma di attendere i rilievi della prossima settimana.

Eventuali criticità possono verificarsi in oliveti irrigui e con drupe ben idratate o al mutare delle condizioni climatiche, a seguito di precipitazioni e abbassamento delle temperature che potrebbero favorire l'avvio delle infestazioni

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE		0-100 m Inf. Attiva (%)	100-200 m Inf. Attiva (%)	200–350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (2%)	—
	PONENTE	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (0%)	—
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (1%)	ALLERTA (7%)
	PONENTE	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (0%)
 FASCIA 3 ENTROTERRA	INTERA FASCIA	NON TRATTARE (0%)		NON TRATTARE (0%)

Per conoscere la fascia e la quota del proprio oliveto e individuare la cella della tabella cui fare riferimento è possibile consultare lo strumento "visualizzatore" all'indirizzo **https://sia.regione.liguria.it/apps/sia/Fasce**

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: **https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot

SAVONA– bollettino n.14 del 13/08/2026

Bollettino Olivo
Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida,** ma potrebbe essere necessario intervenire tempestivamente al mutare delle condizioni climatiche.

Si ricorda che tali prodotti devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non **appena rilevato l'avvio delle infestazioni**. Si ricorda inoltre che è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5) e utilizzare la dose massima consentita da etichetta. La miscela con concimi fogliari o biostimolanti può favorire l'assorbimento del prodotto e migliorarne l'efficacia.

Esche proteiche

È ammesso l'impiego di ***ciantraniliprole*** (Exirel Bait) e ***spinosad*** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO).

Coloro che le stanno impiegando possono continuare a farlo secondo i limiti e le indicazioni riportate in etichetta, ma in caso di avvio rilevante delle infestazioni si consiglia di prevedere l'impiego di prodotti ad azione larvicida.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Mantenere la copertura e ripristinarla tempestivamente in caso di piogge dilavanti, considerando tuttavia che il periodo successivo al ferragosto è generalmente più favorevole all'attività della mosca olearia e caratterizzato da infestazioni più rilevanti. In tali situazioni, valutare la possibilità di integrare tale tecnica con l'impiego di esche proteiche o prodotti ad azione larvicida consentiti in BIO (es. Oikos)

Azadircatina A (Oikos)

Si tratta di un prodotto di origine naturale da impiegarsi all'avvio delle ovideposizioni e da ripetersi a distanza di circa 7-10 giorni dal precedente fino a un massimo di 3 volte.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO **https://bit.ly/RLolivobio** e in integrato **https://bit.ly/RLmoscaolivo**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot