


Monitoraggio della Cecidomia dell'olivo (*Dasineura oleae*) **Comunicato n. 3 del 4 aprile 2024**



Gli areali interessati dalle infestazioni sono in costante aumento anche se l'espansione sul territorio è piuttosto lenta. Negli oliveti colpiti la tendenza dell'intensità delle infestazioni è generalmente in aumento.


La mappa a fianco riporta l'elenco dei comuni dove è stata rilevata la presenza dell'insetto: sono evidenziati in rosso i comuni in cui le infestazioni sono più elevate e tali da compromettere le produzioni; in giallo i comuni in cui attualmente non si osservano danni rilevanti; in arancione i comuni in cui si osservano situazioni intermedie.

A seconda della gravità delle infestazioni in atto sarà necessario intervenire con prodotti specifici al fine di contenere le infestazioni e adottare

diverse misure agronomiche, rinnovando la chioma delle piante maggiormente compromesse.

Maggiori informazioni sui possibili interventi sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/cecidomia>; nei presenti comunicati saranno invece riportati i consigli di trattamento in relazione all'andamento delle infestazioni.

Area del monitoraggio



Nella mappa a fianco sono evidenziati gli oliveti che costituiscono la rete di monitoraggio per l'anno 2024.

Il campione n. 9 e i campioni n. 10-11-12 sono monitorati rispettivamente grazie alla collaborazione del Prof. Ruggero Petacchi e della Cooperativa di Comunità di Vallecchia.

Maggiori dettagli su comuni e quote nella tabella che riporta i dati del monitoraggio.

REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO OLIVICOLTURA

Dati di monitoraggio

Nella tabella sottostante è riportato l'andamento delle infestazioni nelle aziende monitorate nell'ultima settimana. In base alla posizione del proprio oliveto è possibile fare riferimento a una o più aziende monitorate. A partire dalla presenza di pupe, la comparsa delle prime uova è prevista in circa 10/15 giorni. Dati di infestazione completi anche dei dati di mortalità disponibili al link: <https://tinyurl.com/DatiCecidomia2024>

Tabella 1. Qualifica dell'infestazione su campioni prelevati la settimana del 02/04/2024. Dati espressi in percentuale.

Azienda	Comune	Località	Quota	Larve 2 età	Larve 3 età	Pupe	Fori uscita	Presenza uova
1	Sarzana	Ghiarettolo	20	30	31	20	4	no
2	Castelnuovo Magra	Montefrancio	90	17	23	24	9	no
3	Sarzana	Paterno	110	6	19	34	24	no
4	Lerici	Falconara	70	22	8	10	10	si
5	Arcola	Masignano	120	23	39	34	---	no
6	Santo Stefano di Magra	La Macchia	20	16	36	38	2	no
7	Santo Stefano di Magra	Mortedo	110	21	45	18	---	no
8	Bolano	Casesa	160	28	45	12	---	no
9	Castelnuovo Magra	Caprignano	180	12	40	42	---	si
10	Castelnuovo Magra	Vallecchia	300	54	22	10	---	no
11	Castelnuovo Magra	Vallecchia	250	4	66	20	10	si
12	Luni	Palvotrisia	20	4	44	20	16	si

L'attività vegetativa dell'olivo è ben avviata nella maggior parte degli areali. Dall'analisi dei campioni prelevati questa settimana emerge **l'aumento della percentuale di pupe e la presenza dei primi fori d'uscita**, in alcuni casi in percentuali rilevanti; in qualche oliveto è stata osservata anche la **presenza sporadica delle prime uova**, evidenti nella foto a fianco. Rilevata in aumento anche la presenza di **parassitoidi** in diversi areali e campioni analizzati.

Considerata la qualifica delle infestazioni, si ritiene che l'avvio della **fase di ovideposizione sia imminente** nella maggior parte degli areali e in lieve ritardo nelle aree più interne (es. Bolano) e alle quote più elevate.



REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO OLIVICOLTURA

Le tempistiche relative all'attuazione delle diverse tecniche di difesa sono pertanto da intendersi valide per la maggior parte degli areali, ma nelle aree descritte in ritardo gli interventi dovranno essere posticipati di circa 3-5 giorni.

Consigli di intervento

- **Coloro che adottano tecniche di difesa bio o a basso impatto che prevedono l'impiego di repellenti, devono intervenire tempestivamente in tutti gli areali.**

Ulteriori interventi dovranno essere ripetuti per assicurare la copertura della nuova vegetazione in via di emissione e in caso di dilavamento da piogge.

- **Coloro che intendono impiegare Oikos (ammesso in bio) devono eseguire il primo intervento entro circa 5 giorni negli areali più caldi e con qualche giorno di ritardo negli areali in cui il numero di pupe e fori d'uscita risulta ancora limitato.**

Ulteriori interventi dovranno essere ripetuti a distanza di circa 12 giorni rispettando il limite di 3 interventi ammessi.

- **Coloro che intendono impiegare Epik SL devono intervenire tra circa 7-10 giorni e ripetere l'intervento a distanza di circa 12-15 giorni.**

In caso di bassa infestazione è possibile eseguire un solo intervento: in questo caso va eseguito prima del picco delle ovideposizioni, approssimativamente a metà del mese di aprile. Maggiori informazioni a riguardo nei prossimi comunicati.

La registrazione del webinar "Cecidomia dell'olivo. Monitoraggio e servizi regionali" del 14 marzo è disponibile al link: <https://tinyurl.com/WebinarCecidomia>

I comunicati emessi da Regione Toscana sono disponibili [qui](#), consultando la sezione “Bollettini fitosanitari”

➡ **Ulteriori informazioni sulla gestione integrata dell'oliveto sono riportate anche sul Bollettino regionale. L'iscrizione al Bollettino Olivo della Regione Liguria e agli altri servizi informativi è gratuita: sul sito <https://sia.regione.liguria.it> è possibile scaricare il modello di iscrizione. I servizi sono accessibili anche tramite WhatsApp (previa iscrizione) e Telegram ricercando e avviando CAARServiziBot.**