


Monitoraggio della Cecidomia dell'olivo (*Dasineura oleae*) **Comunicato n. 6 del 24 aprile 2024**



Gli areali interessati dalle infestazioni sono in costante aumento anche se l'espansione sul territorio è piuttosto lenta. Negli oliveti colpiti la tendenza dell'intensità delle infestazioni è generalmente in aumento.


La mappa a fianco riporta l'elenco dei comuni dove è stata rilevata la presenza dell'insetto: sono evidenziati in rosso i comuni in cui le infestazioni sono più elevate e tali da compromettere le produzioni; in giallo i comuni in cui attualmente non si osservano danni rilevanti; in arancione i comuni in cui si osservano situazioni intermedie.

A seconda della gravità delle infestazioni in atto sarà necessario intervenire con prodotti specifici al fine di contenere le infestazioni e adottare

diverse misure agronomiche, rinnovando la chioma delle piante maggiormente compromesse.

Maggiori informazioni sui possibili interventi sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/cecidomia>; nei presenti comunicati saranno invece riportati i consigli di trattamento in relazione all'andamento delle infestazioni.

Area del monitoraggio



Nella mappa a fianco sono evidenziati gli oliveti che costituiscono la rete di monitoraggio per l'anno 2024.

Maggiori dettagli su comuni e quote nella tabella che riporta i dati del monitoraggio.

REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO OLIVICOLTURA

Dati di monitoraggio

Nella tabella sottostante è riportato l'andamento delle infestazioni nelle aziende monitorate nell'ultima settimana. Laddove sono stati effettuati trattamenti con prodotti ad azione larvicida non sono stati prelevati campioni. I dati di infestazione della settimana sono riportati nella tabella sottostante e disponibili anche al link: <https://tinyurl.com/DatiCecidomia2024>

Tabella 1. Qualifica dell'infestazione su campioni prelevati la settimana del 22/04/2024. Dati espressi in percentuale.

Azienda	Comune	Località	Quota	Larve 2 età	Larve 3 età	Pupe	Fori uscita	Presenza uova
2	Castelnuovo Magra	Montefrancio	90	---	3	61	27	si
4	Lerici	Falconara	70	---	16	13	18	si
5	Arcola	Masignano	120	---	19	65	16	si
7	Santo Stefano di Magra	Mortedo	110	---	12	42	38	si

Questa settimana sono stati prelevati campioni in oliveti di diversi areali, al fine di verificare l'andamento delle infestazioni, con particolare attenzione al rapporto tra forme già sfarfallate e forme ancora presenti all'interno delle galle.

In tutti i campioni analizzati la maggior parte delle forme rilevate è costituita da pupe, mentre l'incidenza di larve di terza età risulta limitata e mediamente inferiore a quella rilevata lo scorso anno nella stessa settimana.

In alcuni campioni è inoltre emerso un elevato grado di parassitizzazione.

Negli oliveti in cui fin dai primi rilievi lo sviluppo delle forme larvali era risultato più precoce, risulta elevata l'incidenza di fori d'uscita e si può quindi ritenere raggiunto il picco di sfarfallamento e che l'andamento delle ovideposizioni stia entrando nella fase discendente.

Considerata l'elevata percentuale di pupe, nei restanti oliveti il picco della fuoriuscita di adulti e quindi delle ovideposizioni è invece atteso nei prossimi giorni, verosimilmente in coincidenza dello stabilizzarsi delle temperature su valori primaverili.

L'andamento meteo caratterizzato dal ritorno di temperature invernali ha infatti rallentato il ciclo dell'insetto e gli sfarfallamenti di adulti nell'ultima settimana sono risultati limitati a pochi punti percentuali. Di questo aspetto bisogna quindi tenere conto per la valutazione delle tempistiche con cui ripetere gli interventi con prodotti larvicidi, da eseguirsi nel rispetto delle tempistiche sotto riportate, ma attendendo in ogni caso il rialzo delle temperature.

REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO OLIVICOLTURA

Consigli di intervento

- **Coloro che impiegano Epik SL devono ripetere l'intervento a distanza di circa 12-15 giorni dal primo.** In caso di bassa infestazione, è ancora possibile eseguire un solo intervento.
- **Coloro che impiegano repellenti, devono mantenere la copertura sulla nuova vegetazione in via di emissione e rinnovarla tempestivamente in caso di dilavamento da piogge.**
- **Coloro che impiegano Oikos (ammesso in bio) devono ripetere l'intervento a distanza di circa 10-12 giorni dall'ultimo eseguito, rispettando il limite di 3 interventi ammessi.**

La registrazione del webinar "Cecidomia dell'olivo. Monitoraggio e servizi regionali" del 14 marzo e' disponibile al link: <https://tinyurl.com/WebinarCecidomia>

I comunicati emessi da Regione Toscana sono disponibili [qui](#), consultando la sezione “Bollettini fitosanitari”

➡ **Ulteriori informazioni sulla gestione integrata dell'oliveto sono riportate anche sul Bollettino regionale. L'iscrizione al Bollettino Olivo della Regione Liguria e agli altri servizi informativi è gratuita: sul sito <https://sia.regione.liguria.it> è possibile scaricare il modello di iscrizione. I servizi sono accessibili anche tramite WhatsApp (previa iscrizione) e Telegram ricercando e avviando CAARServiziBot.**