





## REGIONE LIGURIA - Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA

Monitoraggio Agro-Ambientale

# BOLLETTINO VITE n° 15 del 20/06/2024 - SAVONA

### PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL-www.arpal.gov





Condizioni di instabilità

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf

#### 45 40 40 36 35 32 30 28 \_3 **E** 25 20 20 15 12 10

Le temperature massime hanno mostrato un andamento altalenante particolarmente accentuato a Cenesi con un picco a fine periodo che ha superato i 28°C in tutti gli areali. Minime costantemente in lieve ascesa su tutto il territorio: da una temperatura iniziale di circa 14 °C si sono superati i 20°C su tutto il territorio, con 22°C registrati a Cenesi. Non si sono rilevati eventi precipitativi significativi durante il periodo.

### FENOLOGIA—*rilievi del 17/06*

In costa e nelle aree interne la maggior parte dei vitigni mostrano acini della misura di un pisello; meno avanzata la fenologia della Lumassina in cui si osservano ali acini della dimensione di un grano di pepe.

LUNEDÌ

24/06/2024

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http:// bit.ly/BBCH Vite



In aumento

Foto Agt. D. Passaniti: Vermentino ad Albenga a sx e Rossese ad Albenga a dx





VIROSI E GIALLUMI -Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virosi e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di segnare le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle SCHEDE TECNICHE OIDIO, PE-RONOSPORA, TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2024. Link:

- https://tinyurl.com/RLoidio
- http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.lv/RL-tignoletta
- https://tinyurl.com/RLtignolarigata

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <a href="https://tinyurl.com/RLcomoidio">https://tinyurl.com/RLcomoidio</a>
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- Tignoletta: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- Tignola rigata: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata

E' stata recentemente revisionata la SCHEDA TECNICA BOTRITE. Link: https://tinyurl.com/botrite con il relativo elenco dei commerciali ammessi: https://tinyurl.com/RLcommbotrite

#### SITUAZIONE FITOSANITARIA

OIDIO: Si osserva una forte pressione della malattia nelle aree costiere e interne e i sintomi in alcuni casi interessano il grappolo. Si raccomanda di aumentare il dosaggio dello zolfo liquido o bagnabile ed eventualmente abbinarlo o alternarlo a prodotti specifici per la difesa del grappolo quali: strobilurine e cyflufenamid (es. Quadris, Flint, Cidely, Rebel top) metrafenone (Vivando, Nabucco, Vulpin). Si consiglia di utilizzare l'intervallo minimo indicato in etichetta tra un trattamento e il successivo oppure alternare con un trattamento a base di zolfo in polvere da distribuire nelle ore più fresche della giornata.

PERONOSPORA: I viticoltori che hanno eseguito trattamenti con soli prodotti di contatto sono invitati a rinnovare la copertura e ripeterla in caso di dilavamento; in condizioni di tempo stabile si possono prolungare i tempi tra un trattamento e il successivo. In questa fase sono consigliati prodotti rameici con eventuale abbinamento a mandipropamide e zoxamide (es. Ampexio, Electis R Flow) in special modo nelle aree interne e/o in caso di piogge. In vigneti soggetti a precedenti attacchi fungini e con ritorno delle piogge si consiglia di abbinare ai prodotti di copertura principi attivi sistemici quali fosfiti/fosfonati (Optix R Disperss, Century, Quartet).

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA— ancora limitate le catture; è possibile visualizzarne l'andamento al seguente link: https://tinyurl.com/ **RLcattureSV** 

AZIENDE BIOLOGICHE: in costa e primo entroterra mantenere protetta la vegetazione alternando zolfo bagnabile ad alto dosaggio e zolfo in polvere, abbinando eventualmente olio di arancio (es. Prev-AM Plus) o bicarbonato di potassio (es. Armicarb 85, Karma 85 o Vitikappa), con effetto antibotritico. Nelle aree più interne e montane abbinare al trattamento antioidico prodotti a base di *rame*. In alternativa o ad integrazione di rame e zolfo è possibile utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti.

POTATURA VERDE— considerando il forte sviluppo delle vegetazione si raccomanda di arieggiare la fascia grappolo mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra), di eseguire una sfemminellatura sempre in zona grappoli e, dove necessario, cimature; queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

#### COMUNICAZIONI

- Prorogata al 1 luglio 2024 la chiusura dei bandi ACA a valere sul PSP 2023-2027. Elenco bandi aperti PSP 2023-2027 e PSR 2014-2022 disponibili al link https://www.agriligurianet.it/it/
- Aggiornamento elenco vigneti eroici e storici della Liguria: info al link https://www.agriligurianet.it/vigneti-eroici-storici
- Flavescenza dorata della vite: Decreto Dirigenziale 2302-2024 disponibile al link https://tinyurl.com/decreto2302flavescenza e Ordinanza n.4 del 22 giugno 2023 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale sulle Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Flavescenza dorata al link https://tinyurl.com/Ordinanza4flavescenza

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278768



