




Cofinanziato
dall'Unione europea



Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”




REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 14 del 12/06/2025 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza


GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 15/06/2025	Possibili locali fenomeni temporaleschi in sconfinamento dai versanti padani	In lieve aumento
LUNEDÌ 16/06/2025	Nuvolosità variabile	In lieve calo

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>



Temperature massime costanti sui 27°C a Cavi di Lavagna, mentre a Cogoleto si registra un importante aumento che da 21°C ha portato al raggiungimento di 30°C. Minime che hanno oscillato tra 18 e 21°C a levante e tra 15 e 18°C a ponente. Precipitazioni praticamente assenti.

FENOLOGIA—rilievi del 09/06



STADIO FENOLOGICO - BBCH	
69	Fine fioritura
71	Allegagione
73	Acini come un grano di pepe
75	Acini della misura di un pisello
77	Inizio chiusura grappolo



In **costa** progredisce l'accrescimento degli acini (BBCH 75) e nei vitigni a grappolo compatto come la *Bianchetta* si inizia ad osservare la fase di chiusura. Nelle **zone interne** si evidenzia una situazione fenologica intermedia tra la fine della fioritura e l'inizio dell'allegagione.

Foto Dr. Calcagno: *Bianchetta* a Chiavari

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite
http://bit.ly/BBCH_Vite

VIROSI E GIALLUMI —Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virusi e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA** e **TIGNOLA RIGATA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2025. Link:

- <https://tinyurl.com/RLoidio> - <http://bit.ly/RLperonospora>
- <https://bit.ly/RL-tignoletta> - <https://tinyurl.com/RLtignolarigata>

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:

- **Oidio**: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- **Peronospora**: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- **Tignoletta**: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- **Tignola rigata**: <https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata>

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDA TECNICA BOTRITE**. Link:
<https://tinyurl.com/botrite> con il relativo elenco dei **commerciali ammessi**:
<https://tinyurl.com/RLcommobotrite>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA: considerando che attualmente ci troviamo in una fase di minor rischio per il grappolo, si consiglia di utilizzare rame eventualmente associato a prodotti con elevata affinità alle cere quali *ametoctradina*, *cyazofamid* e *mandipropamide* (*Electis R Flow*, *Pergado R*). Inoltre nelle **aree interne**, soprattutto nei vitigni e nelle zone più sensibili a **botrite**, si consiglia di associare ai prodotti rameici *zoxamide* e, in caso di sintomi, *cimoxanil*. (*Lieto*, *Reboot*, *Electis Trio*).

OIDIO: ci troviamo in una fase particolarmente **sensibile** al patogeno; si consiglia di intervenire con prodotti a lunga persistenza a base di *pencnazolo*, *tetraconazolo*, *mefentrifluconazolo* (*Scudex*, *Topas*, *Domark*, *Revsion*), *strobilurine* (es. *Quadris*, *Tucana*, *Flint*), *cyflufenamid* e *metrafenone* (es. *Vivando*, *Cidely*), anche in associazione a zolfo, facendo attenzione all'alternanza dei principi attivi per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza.

BOTRITE: Nei vigneti della **costa**, che presentano il grappolo in fase di inizio chiusura (*Bianchetta*), è opportuno fare il primo trattamento dedicato contro la botrite. A tal fine possono essere impiegati prodotti a base di *fludioxonil* associato a *ciprodinil* (*Switch*). Inoltre in un'ottica di riduzione dei trattamenti, risultano molto efficaci per limitare tale patologia gli interventi di **sfolgiatura in zona grappolo** (vedi box sotto).

AZIENDE BIOLOGICHE: vista la sensibilità della fase fenologica attuale, mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di **rame e zolfo** bagnabile o liquido; in presenza di bagnature prolungate con vitigni sensibili a marciumi è possibile intervenire con **bicarbonato di potassio**. In alternativa o a integrazione del rame e dello zolfo si possono utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti.

POTATURA VERDE— considerando il forte sviluppo vegetativo si raccomanda di concludere le operazioni di **sistemazione** della vegetazione e di **cimatura**, arieggiando la fascia grappolo mediante **sfolgiatura** (le foglie poste in ombra) e procedendo alla **sfemminellatura**; queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

COMUNICAZIONI - Con Decreto Dirigenziale 4343-2025 del Servizio Fitosanitario regionale è stata aggiornata la **DELIMITAZIONE delle aree interessate alla presenza di flavescenza dorata della vite in Regione Liguria**. Decreto al link: <https://tinyurl.com/yp7jxnxz>

- Ordinanza n.4 del 22 giugno 2023 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale sulle **Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Flavescenza dorata** al link <https://tinyurl.com/Ordinanza4flavescenza>

- Aggiornamento Disciplinari di Produzione Integrata 2025—Disciplinare vite scaricabile al link <https://tinyurl.com/DisciplinareVite>

- Prorogati al 16 giugno 2025 i termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025. Elenco bandi aperti PSP 2023-2027 e PSR 2014-2022 disponibili al link <https://www.agriligurianet.it/it/>

- Aggiornamento elenco vigneti eroici e storici della Liguria: info al link <https://www.agriligurianet.it/vigneti-eroici-storici>