




Cofinanziato
dall'Unione europea




REGIONE LIGURIA

iano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

BOLLETTINO VITE n° 19 del 17/07/2025 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza


GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 20/07/2025	Nuvolosità sparsa	Stazionarie o in lieve aumento
LUNEDÌ 21/07/2025	Nuvolosità variabile con locali deboli piogge	Generalmente stazionarie

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>



Temperature massime costanti intorno ai 30°C a Cavi di Lavagna, sui 27°C a Cogoleto fatto salvo un brusco calo in data 13/7, in concomitanza di un evento precipitativo di ben 60 mm di cumulato (solo 8 mm a levante). Minime costanti a 20-21°C a levante, mentre a ponente si registra un lieve aumento, con valori che passano da 15 a 18°C.

FENOLOGIA—rilievi del 14/07



Nell'entroterra tutti i vitigni hanno completato la chiusura dei grappoli (BBCH 79). Nelle aree costiere è iniziata l'invasatura (BBCH 81), più evidente nella Granaccia e nel Ciliegiole; nel Vermentino e nella Bianchetta è in corso un graduale cambiamento nella consistenza degli acini che acquisiscono maggior elasticità.

Foto Dr. Calcagno: Bianchetta a Castiglione Chiavarese.

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

SITUAZIONE IDRICA Le recenti piogge hanno momentaneamente ripristinato la riserva idrica. Situazione aggiornata al link <https://sia.regione.liguria.it/apps/sia/Irrigazione>.

>> Dichiarato lo **STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria a partire dalle ore 00:01 di sabato 05/07/2025: è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link <https://tinyurl.com/RLincendi2025>

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA, TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2025. Link:

- <https://tinyurl.com/RLoidio>
- <http://bit.ly/RLperonospora>
- <https://bit.ly/RL-tignoletta>
- <https://tinyurl.com/RLtignolarigata>
- <https://tinyurl.com/botrite>

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- Tignola rigata: <https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata>
- Botrite: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA PERONOSPORA: in questa fase fenologica, in cui i grappoli sono prossimi all'invasatura, la sensibilità al patogeno si riduce; nelle aree in cui si sono verificate abbondanti piogge è opportuno mantenere protetta la vegetazione con rame eventualmente associato a prodotti specifici, soprattutto in presenza di infezioni pregresse, quali *fosfiti/fosfonati*, *zoxamide* (*Electis R Flow*), *cimoxanil* (*Curzate Erre Evo*), *ametoctradina*, *oxathiapiprolin* (*Enervin system*).

OIDIO: nelle aree costiere, in assenza di sintomi e una volta raggiunta l'invasatura (in particolare nei vitigni rossi), il rischio di infezioni si riduce ed è possibile **sospendere** i trattamenti.

Nelle aree interne e nei vigneti in cui non si sono manifestati sintomi è possibile allungare i tempi tra un trattamento e il successivo ed utilizzare anche prodotti corroboranti e induttori di resistenza.

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA: modeste al momento le catture; andamento disponibile al link: <https://tinyurl.com/RLcattureGE>.

AZIENDE BIOLOGICHE: contro l'oidio mantenere la copertura con **zolfo** bagnabile o in alternativa utilizzare *laminarina* (*Vacciplant*). In presenza di sintomi è preferibile intervenire con olio essenziale di arancio dolce o *bicarbonato di potassio* (es. *Armcarb 85*, *Vitikkappa*, *Karma 85*) che ha anche un effetto antibotritico. Per peronospora, solo in previsione di pioggia, è opportuno rinnovare la copertura con **rame**, eventualmente associando prodotti ad azione complementare a largo spettro, anche per ridurre il dosaggio (es. corroboranti ed induttori di resistenza).

MAL DELL'ESCA E VIROSI - nel periodo estivo è possibile notare segni di virosi e di mal dell'esca. La virosi più facilmente osservabile è l'**accartocciamento fogliare**, che determina decolorazioni delle foglie a partire da quelle basali, di colore rossastro (cv a bacca rossa) o giallo (cv a bacca bianca). Per il mal dell'esca (vedi foto) i sintomi caratteristici sono aree clorotiche sulle lamine fogliari, con tendenza ad aumentare di dimensione e a seccare, mentre i tessuti fogliari lungo le nervature rimangono verdi (cosiddetta *tigratura*) e i tralci avvizziscono e seccano. Per entrambe le patologie è opportuno segnare le piante sintomatiche, così da poterle estirpare o, nel caso dell'esca, provare a risanare.



COMUNICAZIONI

È attivo il nuovo canale WhatsApp **CAAR REGIONE LIGURIA**, attraverso il quale è possibile consultare i bollettini informativi e accedere a molti altri contenuti. È possibile accedere ed iscriversi tramite il QRcode a fianco oppure cliccando sul seguente link:

<https://whatsapp.com/channel/0029VaQ0PhUJHwq8w6C3ch2f>



www.facebook.com/agriligurianet



Telegram: CAARserviziBot