REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA

Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 4 del 03/04/2025 - SAVONA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza

GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 06/04/2025	Soleggiato con possibili precipitazioni	Stazionarie
LUNEDÌ 07/04/2025	Cielo sereno o poco nuvoloso	In sensibile calo

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le temperature massime, dopo un calo fino a 18°C, hanno registrato un importante aumento che ha portato in particolare Pietra Ligure fino a ben 26° C, per poi scendere il 2/4 fino a 16°C (addirittura 12°C a Celle). Minime costanti intorno ai 12°C su tutti gli areali, con Celle che sempre il 2/4 ha registrato un calo fino a 8°C. Precipitazioni praticamente assenti.

FENOLOGIA

In assenza di rilievi puntuali in campo è stato utilizzato il modello di simulazione fenologica in uso al CAAR; è possibile ipotizzare situazioni variabili tra i vitigni e le diverse aree, comprese prevalentemente tra **gemme cotonose** e **inizio germogliamento** soprattutto nella parte di territorio del centro levante, mentre nel centro ponente la situazione più frequente sembra essere compresa tra **apertura gemme** e **prime foglie distese**. Nelle aree più calde e soprattutto in vitigni a **bacca rossa** il modello simula situazioni di **grappoli visibili**.

La carta a fianco è il risultato dell'elaborazione del modello fenologico per la **cv *Vermentino* in data 01 aprile.** In costa e nell'immediato entroterra, in particolare del centro-ponente, le fasi previste sono prevalentemente comprese tra la BBCH 11 e la BBCH 13. Nelle zone più interne emerge una situazione più arretrata, compresa mediamente tra punte verdi visibili e apertura gemme.



Foto Agt. Passaniti: Pigato a Ortovero sx e Rossese ad Albenga a dx

La **scala fenologica BBCH** è una scala internazionale di riferimento che è ripartita, per ogni specie vegetale, in 10 stadi principali: dal germogliamento/ripresa vegetativa alla fine del ciclo vegeto produttivo della specie in considerazione. Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite
http://bit.ly/BBCH_Vite

IN CAMPO

GESTIONE INFESTANTI

Il cotico erboso, particolarmente utile in collina e nelle aree in pendenza, consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e trattenere l'acqua, di incrementare la sostanza organica dei suoli e ridurre l'erosione, stabilizzando il terreno e migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi. Il controllo delle infestanti può avvenire mediante mezzi meccanici, quali sfalci e trinciature o altri mezzi non chimici (es. pirodiserbo) nel sottofila. Coloro che hanno seminato specie da sovescio possono trinciare nella fase della fioritura e, dopo 24-48 ore, interrare. Nell'ambito della produzione integrata, il ricorso al mezzo chimico è da ritenersi l'ultima soluzione ed eventualmente deve essere attuato come previsto dal Disciplinare, utilizzando i principi attivi ammessi con le relative limitazioni. Si ricorda che chi aderisce all'intervento **ACA5,** che prevede incentivi per il mantenimento dell'inerbimento **(parziale o totale)** delle colture arboree, deve attenersi a specifici impegni, che prevedono in particolare il **divieto di lavorazione del suolo** ed **il divieto di diserbo chimico**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

OIDIO ed ESCORIOSI: nei vigneti con significativa presenza di escoriosi o nei vitigni particolarmente sensibili a oidio è possibile effettuare un trattamento con Zolfo ad alto dosaggio dalla fase BBCH 8 (apertura gemme), da ripetersi a distanza di 7-10 giorni.

PERONOSPORA: questa settimana i germogli non sono ancora ricettivi e, sebbene la fenologia stia progredendo rapidamente, non dovrebbero verificarsi nei prossimi giorni precipitazioni tali da favorire l'avvio di eventuali infezioni.

NOTTUE: sono farfalle le cui larve si nutrono delle gemme di vite, risalendo dal terreno durante la notte. E' opportuno tenere sotto controllo eventuali zone predisposte e già attaccate negli anni precedenti. Il danno avviene dalla fase di gemme cotonose (BBCH 5) alla fase di spiegamento prima foglia (BBCH 11). Tra le pratiche per la difesa è possibile posizionare anelli di plastica rovesciati ben aderenti al tronco in modo che non vi sia spazio per il passaggio delle larve. Sono sconsigliati interventi chimici.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDA TECNICA OIDIO della VITE** e **PERONOSPORA della VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2025. Link: https://tinyurl.com/RLoidio e http://bit.ly/RLperonospora

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Escoriosi: https://tinyurl.com/RLcomescoriosi
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora

COMUNICAZIONI

- **Disciplinari di Produzione Integrata 2025** scaricabili al link https://www.agriligurianet.it/disciplinari25
- **Bando OCM Vino- proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria:** Il termine per la presentazione delle domande di aiuto limitatamente alla campagna 2025/2026 è posticipato al 30 aprile 2025, mentre il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande ammissibili è fissato al 15 dicembre 2025. Info al link https://www.agriligurianet.it/contributi viticoltura
- **Vinitaly 2025—**dal 6 al 9 aprile a Verona, info al link https://www.vinitaly.com/

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - **tel.** 0187.278768
e-mail caarservizi@regione.liguria.it– **Web** www.agriligurianet.it, https://sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot