Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 13 del 04/06/2026 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza


GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 07/06/2026	Soleggiato, aumento della nuvolosità sui rilievi nel pomeriggio con locali piovaschi	Stazionarie o in lieve aumento
LUNEDÌ 08/06/2026	Soleggiato, addensamenti pomeridiani sui rilievi con rovesci sparsi	In deciso aumento

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le massime mostrano un andamento piuttosto altalenante a Cogoleto, con un aumento il 29/5 fino a 31,4°C e una netta diminuzione in data 2/6 in cui si sono raggiunti i 22,5°C, in concomitanza di un evento piovoso; più lineare l'andamento delle massime a Cavi di Lavagna, tra 27 e 26°C. Le minime hanno registrato un calo progressivo a fine periodo considerato, attestandosi tra i 16 e i 18°C. Le precipitazioni sono state particolarmente abbondanti a Cavi il 2 e il 3/6, con cumulati che hanno superato i 30 mm.

FENOLOGIA—*rilievi del 01/06*





Prosegue il progresso fenologico, con i vigneti di **costa** e di **primo entroterra** in cui gli acini sono in rapido accrescimento e mostrano ormai per la maggior parte la misura di un pisello. Nelle **aree interne** si osserva prevalentemente l'allegagione (BBCH71) ma è già possibile rilevare acini della dimensione di un grano di pepe.
Foto Dott. Calcagno: Ciliegiolo a Sestri Levante
Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Il **Decreto dirigenziale n. 8271-2025** ha aggiornato, sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata, le **aree delimitate** in cui devono essere adottate misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite; le aree sono così costituite: una **zona infestata** e una **zona cuscinetto** adiacente e circostante la zona infestata con un'estensione di 500 metri di raggio. Per la Città Metropolitana di Genova la zona infestata comprende i seguenti comuni: **Casarza Ligure, Cogorno, Genova, Lavagna, Né, Sant'Olcese, Sestri Levante, Chiavari** (*nuovo ritrovamento), **Serra Riccò** (*nuovo ritrovamento), **Castiglione Chiavarese** (*nuovo ritrovamento).
**nuovo ritrovamento: Comune decretato zona infestata sulla base di campioni di vite risultati positivi ad analisi ufficiali di laboratorio nel corso della campagna di monitoraggio 2025.*

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA, TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:
- https://tinyurl.com/RLoidio
- http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta
- https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:
- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA PERONOSPORA: le condizioni meteo degli ultimi giorni sono risultate favorevoli in diverse aree alla ripresa di infezioni, ma con l'accrescimento degli acini la maggior parte dei vitigni sta raggiungendo ormai una fase fenologica meno sensibile al patogeno; in queste aree è possibile utilizzare prodotti rameici, mentre nelle aree più interne a fenologia meno avanzata, è opportuno mantenere protetta la vegetazione associando al rame prodotti sistemici e a maggiore persistenza quali *fosetyl-Al e fosfonati. oxathiapiprolin, ametoctradina, zoxamide (Electis R Flow, Enervin, Orondis*), eventualmente associati a *cimoxanil* in caso di sintomi.
OIDIO: ci troviamo in una fase particolarmente sensibile al patogeno; è opportuno quindi mantenere protetta la vegetazione con zolfo bagnabile preferibilmente associato a prodotti specifici e persistenti con elevata affinità alle cere, quali *fluxapyroxad, strobilurine, cyflufenamid* e *metrafenone* (*Sercadis, Quadris, Cidely, Vivando*), tenendo sempre presente il principio dell'**alternanza** delle sostanze attive in base al diverso meccanismo d'azione.
FLAVESCENZA DORATA - per chi non avesse ancora eseguito il trattamento contro lo scafoideo **è ancora possibile effettuarlo** secondo le indicazioni del precedente bollettino. Elenco dei commerciali ammessi al link: https://tinyurl.com/RLcommscafoideo. Sono inoltre disponibili, a cura del Servizio fitosanitario nazionale, le **linee guida per il contrasto della flavescenza dorata** al link: https://www.protezionedellepiante.it/lineeguida.pdf
TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA — Modeste al momento le catture.
AZIENDE BIO: vista la sensibilità della fase fenologica attuale, è opportuno mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di rame e zolfo bagnabile o liquido. In alternativa o a integrazione del rame e dello zolfo si possono utilizzare prodotti **coadiuvanti o corroboranti** (*COS-OGA e Cerevisane*). In presenza di bagnature prolungate con vitigni sensibili a marciumi è possibile abbinare a rame e zolfo **zeolite** o formulati compatibili a base di **bicarbonato di potassio** e **bicarbonato di sodio**. Per la lotta a **flavescenza dorata**, è possibile utilizzare prodotti a base di *piretro* dopo il tramonto (acidificando leggermente la soluzione), di *azadiractina* (es. *Oikos*), *sali potassici di acidi grassi* (es. *Flipper*) e *olio di arancio* (es. *Prev-AM Plus*), quest'ultimo utilizzato anche nella difesa antioidica e antiperonosporica.

POTATURA VERDE— considerando il forte sviluppo vegetativo si raccomanda di concludere le operazioni di **sistemazione** della vegetazione e di **cimatura**, arieggiando la fascia grappolo mediante **sfogliatura** (le foglie poste in ombra) e procedendo alla **sfemminellatura**; queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

COMUNICAZIONI

- **Decreto dirigenziale n. 8271-2025 e Indicazioni tecniche per la lotta alla flavescenza dorata** predisposte dal Settore Fitosanitario Regionale consultabili al link: https://www.agriligurianet.it/it/flavescenzadorata
- **Intervento settoriale per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi - 2026/2027:** Info al link: https://tinyurl.com/promozionevino
- **Complemento regionale per lo sviluppo rurale - CSR 2023-2027**: bandi aperti disponibili al link https://tinyurl.com/CSRbandiaperti

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP)
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot