Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 14 del 11/06/2026 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza


GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 14/06/2026	Nuvolosità variabile	In lieve calo
LUNEDÌ 15/06/2026	Nuvolosità bassa	In leggero aumento

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le massime hanno registrato un lieve aumento a levante, dove si è passati da 25 a 27°C, mentre a ponente, nonostante un andamento altalenante, si sono attestate sui 24°C. Anche le minime non hanno avuto importanti variazioni: tra 18 e 19°C a Cavi, 16°C a Cogoleto. Le precipitazioni si sono concentrate tra il 4 e il 5/6 in entrambe le aree considerate, con cumulati piuttosto modesti.

FENOLOGIA—*rilievi del 08/06*



STADIO FENOLOGICO - BBCH	
71	Allegagione
73	Acini come un grano di pepe
75	Acini della misura di un pisello
77	Inizio chiusura grappolo
79	Chiusura grappolo

In **costa** la *Bianchetta* ha completato la chiusura del grappolo (BBCH 79) e si approssima alla completa chiusura anche nell'**entroterra**. Gli altri vitigni mostrano acini di una misura intermedia tra grano di pepe e pisello (BBCH 73-75), ad eccezione di alcune varietà delle **aree interne** che risultano ancora in fase di allegagione (BBCH 71).



Foto Dott. Calcagno: Bianchetta a Chiavari

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

SITUAZIONE IDRICA Non si rilevano al momento particolari situazioni di carenza. Situazione aggiornata e apporti idrici consigliati al link https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA, TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:
- https://tinyurl.com/RLoidio - http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta - https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:
- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA PERONOSPORA: considerando lo sviluppo fenologico, in costa e primo entroterra è possibile utilizzare prodotti rameici eventualmente associati a corroboranti e coadiuvanti, mentre nelle aree più interne a fenologia meno avanzata, è opportuno associare a rame prodotti maggiormente persistenti e con elevata affinità alle cere quali *zoxamide* (con azione collaterale antibotritica), *mandipropamide, oxathiapiprolin (Electis R Flow, Ampexio, Zorvec Vinabel).*
OIDIO: allo scadere del periodo di protezione del precedente trattamento, è opportuno continuare a proteggere la vegetazione con zolfo bagnabile preferibilmente associato a **prodotti specifici e persistenti** con elevata affinità alle cere, quali *strobilurine, cyflufenamid* e *metrafenone* (*Quadris, Cidely, Vivando*), e *mefentrifluconazolo (Revysion);* quest'ultimo, utilizzato contro oidio e black rot, svolge anche una azione collaterale antibotritica.
BOTRITE: Nei vigneti della **costa**, che presentano il grappolo in fase di chiusura (*Bianchetta*), è opportuno fare il primo trattamento dedicato contro la botrite. A tal fine possono essere impiegati prodotti a base di *fludioxonil* associato a *ciprodinil* (es. *Switch*). Inoltre in un'ottica di riduzione dei trattamenti, risultano molto efficaci per limitare tale patologia gli interventi di **sfogliatura in zona grappolo** (vedi box sotto).
TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA — Modeste al momento le catture.
AZIENDE BIO: vista la sensibilità della fase fenologica attuale, è opportuno mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di rame e zolfo bagnabile o liquido. In alternativa, o a integrazione del rame e dello zolfo, si possono utilizzare prodotti **coadiuvanti o corroboranti** (*COS-OGA* e *Cerevisane*). In presenza di bagnature prolungate con vitigni sensibili a marciumi è possibile abbinare a rame e zolfo **zeolite**, formulati compatibili a base di **bicarbonato di potassio** e **bicarbonato di sodio** e prodotti a base di **terpeni** (*3Logy*).

VIROSI E GIALLUMI -Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, affette da virosi e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

POTATURA VERDE— considerando il forte sviluppo vegetativo si raccomanda di concludere le operazioni di **sistemazione** della vegetazione e di **cimatura**, arieggiando la fascia grappolo mediante **sfogliatura** (le foglie poste in ombra) e procedendo alla **sfemminellatura**; queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

COMUNICAZIONI - Intervento settoriale per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi - 2026/2027: Info al link: https://tinyurl.com/promozionevino
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale - CSR 2023-2027: bandi aperti disponibili al link https://tinyurl.com/CSRbandiaperti

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP)
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot