Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

# BOLLETTINO VITE n° 17 del 02/07/2026 - GENOVA

## PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




### Tendenza


| GIORNO | PREVISIONI | TEMPERATURE |
|---|---|---|
| DOMENICA 05/07/2026 | Sereno, addensamenti pomeridiani sui rilievi | Stazionarie |
| LUNEDÌ 06/07/2026 | Soleggiato con aumento della nuvolosità bassa da metà giornata | Stazionarie |

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf




Le temperature minime, a partire dal 28/6, hanno registrato un calo a levante (da 34 a 31°C), mentre a ponente si sono mantenute mediamente costanti sui 33°C. Minime in calo, con Cogoleto che scende da 23 a 21°C e Cavi da 25 a 21°C. Precipitazioni scarse e concentratesi in data 1/7.

## FENOLOGIA—*rilievi del 29/06*






La maggior parte dei vitigni della costa e dell'entroterra ha terminato la chiusura del grappolo e nell'area di Sestri Levante si osservano i primi acini di Ciliegiolo invaiati; permangono situazioni a fenologia meno avanzata (es. zona di castiglione Chiavarese) in cui la chiusura è appena iniziata .
*Foto Dott. Calcagno: Moscato a Castiglione Chiavarese*
Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

**LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE**
Il **Decreto dirigenziale n. 8271-2025** ha aggiornato, sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata, le **aree delimitate** in cui devono essere adottate misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite; le aree sono così costituite: una **zona infestata** e una **zona cuscinetto** adiacente e circostante la zona infestata con un'estensione di 500 metri di raggio. Per la Città Metropolitana di Genova la zona infestata comprende i seguenti comuni: **Casarza Ligure, Cogorno, Genova, Lavagna, Né, Sant'Olcese, Sestri Levante, Chiavari** (*nuovo ritrovamento), **Serra Riccò** (*nuovo ritrovamento), **Castiglione Chiavarese** (*nuovo ritrovamento).
**nuovo ritrovamento: Comune decretato zona infestata sulla base di campioni di vite risultati positivi ad analisi ufficiali di laboratorio nel corso della campagna di monitoraggio 2025.*

**COMUNICAZIONI - Decreto dirigenziale n. 8271-2025 e Indicazioni tecniche per la lotta alla flavescenza dorata** predisposte dal Settore Fitosanitario Regionale al link: https://www.agriligurianet.it/it/flavescenzadorata

**SITUAZIONE IDRICA** Si osserva in diverse aree un progressivo esaurimento delle riserve idriche; si consigliano interventi in terreni sciolti e medio impasto, secondo gli apporti disponibili al link https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php

**>>** Dichiarato lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link https://tinyurl.com/Gravepericolositaincendi

## IN CAMPO

**SITUAZIONE FITOSANITARIA BOTRITE:** Per coloro che non hanno ancora eseguito il primo trattamento contro botrite, si consiglia di procedere utilizzando prodotti a base di *fludioxonil* associato a *ciprodinil* (es. *Switch*) o *fenhexamid (Teldor plus).* Per le aziende bio è possibile utilizzare alcuni prodotti ad azione **preventiva** di origine naturale che agiscono per antagonismo, quali *Bacillus subtilis (Serenade ASO), Bacillus amyloliquefaciens (Amylo-X).*
**OIDIO**: in costa, in caso di flessione delle temperature si consiglia di intervenire con zolfo bagnabile preferibilmente abbinato a prodotti specifici, soprattutto in caso di vitigni sensibili, ad esempio *metrafenone, strobilurine, IBE, fluxapyroxad (Vivando, Sercadis, Tucana).* Nelle aree interne in cui si sono verificate precipitazioni si consiglia di intervenire con zolfo bagnabile abbinato al trattamento antiperonosporico.
**PERONOSPORA:** in costa e nelle aree interne in assenza di sintomi il rischio rimane basso; si consiglia di intervenire con rame a basso dosaggio in associazione al trattamento antioidico. Nelle aree interne in presenza di sintomi e con piogge significative, è opportuno utilizzare rame preferibilmente in associazione ad un prodotto curativo, come *cimoxanil (Curzate Erre Evo).*
**FLAVESCENZA DORATA**: in questo periodo **è obbligatorio eseguire il secondo trattamento contro lo scafoideo** nei ***Comuni*** indicati nel box giallo, utilizzando i principi attivi ammessi dal Disciplinare, quali ***acetamiprid*** (es. *Epik SL*), ***etofenprox*** (es. *Trebon up*), ***flupyradifurone*** (*Sivanto*) avendo cura di bagnare bene anche la parte bassa delle piante. Elenco dei commerciali ammessi al link: https://tinyurl.com/RLcommscafoideo .
A salvaguardia degli insetti impollinatori, prima di intervenire, sfalciare le eventuali erbe spontanee sottostanti il vigneto 2-3 giorni prima del trattamento. Sono inoltre disponibili, a cura del Servizio fitosanitario nazionale, le **linee guida per il contrasto della flavescenza dorata** al link:
https://www.protezionedellepiante.it/lineeguida.pdf

**TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA —** Andamento disponibile al link https://tinyurl.com/RLcattureGE . Si ricorda che il secondo trattamento obbligatorio contro lo Scafoideo contribuisce anche al contenimento di tignoletta.
**AZIENDE BIO:** nelle aree interne in cui si sono verificate precipitazioni si consiglia di mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di rame (alle dosi più basse) e zolfo bagnabile o liquido. In alternativa, o a integrazione del rame e dello zolfo, anche per contrastare i marciumi del grappolo, si possono utilizzare prodotti **coadiuvanti** o **corroboranti** quali *zeolite, Cerevisane, COS-OGA e terpeni,* evitando le applicazioni nelle ore più calde della giornata. Per la lotta a flavescenza dorata, è possibile utilizzare prodotti a base di *piretro* dopo il tramonto (acidificando leggermente la soluzione), di *azadiractina* (es. *Oikos*), *sali potassici di acidi grassi* (es. *Flipper*) e *olio di arancio* (es. *Prev-AM Plus*), quest'ultimo utilizzato anche nella difesa antioidica e antiperonosporica.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA, TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:
- https://tinyurl.com/RLoidio - http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta - https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:
- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

**REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—**Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP)
**e-mail** caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot