Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 4 del 02/04/2026 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza


GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 05/04/2026	Soleggiato, addensamenti di nubi basse dal pomeriggio	Minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo
LUNEDÌ 06/04/2026	Alternanza di schiarite e addensamenti di nubi basse	Stazionarie o in lieve calo

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le temperature massime hanno avuto un andamento oscillante, con un aumento significativo intorno al 29 marzo in cui si sono raggiunti i 20,5 °C a Dolceacqua, per poi diminuire progressivamente a fine periodo. Piuttosto altalenanti anche le minime, con valori che in data 28/3 a Dolceacqua hanno toccato i 3°C, per poi tornare in tutte le aree considerate ai valori di inizio periodo. Precipitazioni assenti.

FENOLOGIA



In assenza di rilievi puntuali in campo è stato utilizzato il modello di **simulazione fenologica** in uso al CAAR; la mappa è il risultato dell'elaborazione del modello fenologico alla data del **31 marzo**. E' possibile ipotizzare situazioni variabili tra i vitigni e le diverse aree, comprese prevalentemente tra la fase di **gemme cotonose** nelle aree più interne e **prime foglie distese** in costa e nelle aree meglio esposte del primo entroterra; per i vitigni a bacca rossa delle aree costiere si possono rilevare i primi **grappoli visibili** mentre nelle zone montane la fase massima simulata è quella di gemma cotonosa.

Foto: gemme cotonose a sx prime foglioline distese a dx





La **scala fenologica BBCH** è una scala internazionale di riferimento che è ripartita, per ogni specie vegetale, in 10 stadi principali: dal germogliamento/ripresa vegetativa alla fine del ciclo vegeto produttivo della specie in considerazione. Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

IN CAMPO

GESTIONE INFESTANTI Il cotico erboso, particolarmente utile in collina e nelle aree in pendenza, consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e trattenere l'acqua, di incrementare la sostanza organica dei suoli e ridurre l'erosione, stabilizzando il terreno e migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi. Il controllo delle infestanti può avvenire mediante mezzi meccanici, quali sfalci e trinciature o altri mezzi non chimici (es. pirodiserbo) nel sottofila. Coloro che hanno seminato specie da sovescio possono trinciare nella fase della fioritura e, dopo 24-48 ore, interrare. Nell'ambito della **produzione integrata**, il ricorso al mezzo chimico è da ritenersi l'ultima soluzione ed eventualmente deve essere attuato come previsto dal Disciplinare, utilizzando i principi attivi ammessi con le relative limitazioni. Si ricorda che chi aderisce all'intervento **SRA-ACA5**, che prevede incentivi per il mantenimento dell'**inerbimento (parziale o totale)** delle colture arboree, deve attenersi a specifici impegni, che prevedono in particolare il **divieto di lavorazione del suolo** ed **il divieto di diserbo chimico**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

OIDIO ed ESCORIOSI: nei vigneti con significativa presenza di escoriosi o nei vitigni particolarmente sensibili a oidio è possibile effettuare un trattamento con Zolfo ad alto dosaggio dalla fase BBCH 8 (apertura gemme), da ripetersi a distanza di 7-10 giorni.

PERONOSPORA: questa settimana i germogli non sono ancora ricettivi e, sebbene la fenologia stia progredendo rapidamente, non dovrebbero verificarsi nei prossimi giorni precipitazioni tali da favorire l'avvio di eventuali infezioni.

NOTTUE: sono farfalle le cui larve si nutrono delle gemme di vite, risalendo dal terreno durante la notte. E' opportuno tenere sotto controllo eventuali zone predisposte e già attaccate negli anni precedenti. Il danno avviene dalla fase di gemme cotonose (BBCH 5) alla fase di spiegamento prima foglia (BBCH 11). Tra le pratiche per la difesa è possibile posizionare anelli di plastica rovesciati ben aderenti al tronco in modo che non vi sia spazio per il passaggio delle larve. Sono sconsigliati interventi chimici.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDA TECNICA OIDIO della VITE** e **PERONOSPORA della VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link: https://tinyurl.com/RLoidio e http://bit.ly/RLperonospora

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Escoriosi: https://tinyurl.com/RLcomescoriosi
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora

COMUNICAZIONI - Disciplinari di Produzione Integrata 2026 scaricabili al link https://www.agriligurianet.it/disciplinari26

- Autorizzazioni per l'impianto di nuovi vigneti: Proroga termine ultimo per la presentazione domande di nuove autorizzazioni 2026. Info al link https://www.agriligurianet.it/autorizzazioni nuovi impianti

- Complemento regionale per lo sviluppo rurale - CSR 2023-2027: bandi aperti disponibili al link https://tinyurl.com/CSRbandiaperti

- Vinitaly 2026 dal 12 al 15 aprile a Verona**. Info al link** https://www.vinitaly.com/

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP) - **tel.** 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot