Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 12 del 28/05/2026 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza

GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 31/05/2026	Soleggiato con qualche velatura	Minime in aumento, massime in calo
LUNEDÌ 01/06/2026	Nubi irregolari	In calo

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le temperature massime hanno registrato un deciso aumento: da 24 a 30°C a Imperia, da 26-27°C a 30-33°C su Ranzo e Dolceacqua; in data 27/5 un successivo calo, deciso su Imperia. Minime in aumento costante, con Ranzo e Dolceacqua che sono passati da 12 a 18°C e Imperia da 15 a 21°C. Precipitazioni assenti.

FENOLOGIA—*rilievi del 25/05*

Le elevate temperature, al di sopra delle medie del periodo, hanno determinato un rapido progresso fenologico: nell'areale **costiero** è ormai terminata la fioritura e si osservano i primi grappoli allegati (BBCH 69-71), nelle **aree interne** prevale la fioritura (BBCH 61-65), mentre nelle **zone montane** i bottoni fiorali si distanziano tra loro (BBCH57).

STADIO FENOLOGICO - BBCH	
57	Bottoni fiorali separati
61	Inizio fioritura
65	Piena fioritura
69	Fine fioritura
71	Allegagione

VITIGNO
- ROSSESE DOLCEACQUA
- ORMEASCO
- VERMENTINO
- PIGATO






Foto Agt. Passaniti: Pigato a Pontedassio

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Il **Decreto dirigenziale n. 8271-2025** ha aggiornato, sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata, le **aree delimitate** in cui devono essere adottate misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite; le aree sono così costituite: una **zona infestata** e una **zona cuscinetto** adiacente e circostante la zona infestata con un'estensione di 500 metri di raggio. Nella provincia di Imperia il Decreto **non prevede ulteriori Comuni** in cui effettuare il trattamento; l'area individuata comprende infatti i Comuni già precedentemente indicati: **Caravonica, Ceriana, Chiusavecchia, Olivetta San Michele, Pornassio.**

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA, TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:
- https://tinyurl.com/RLoidio
- http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta
- https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:
- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA: negli areali a fenologia più avanzata il rischio di nuove infezioni a danno dei grappoli, considerando la fase di rapido accrescimento degli acini, è ormai molto basso. E' sufficiente quindi in area litoranea ripristinare la protezione, in caso di pioggia o bagnatura fogliare prolungata, con prodotti di copertura rameici. Nelle aree interne si consiglia di attendere la fine della fioritura, mentre nelle zone montane, maggiormente soggette a temporali pomeridiani, si consiglia di mantenere protetta la vegetazione e verificare le condizioni meteo per pianificare il nuovo trattamento. In queste aree si consiglia di utilizzare miscele a bassa dilavabilità e maggiore persistenza quali: *fosfiti/fosfonati, metalaxil-M, ametoctratina, zoxamide, cyazofamid, oxathiapiprolin* in abbinamento a *metiram* o *folpet.*

OIDIO: Dall'allegagione inizia una fase di elevata sensibilità al patogeno, pertanto è consigliabile rispettare gli intervalli tra un trattamento e il successivo, aumentare il dosaggio dello zolfo bagnabile o liquido, abbinando antioidici ad azione sistemica come gli IBE (*Scudex, Topas, Radar combi Flow, Domark, Concorde, Score 10 WG, Revysion*), e alcuni prodotti dotati di ottima azione preventiva, quali *fluxapyroxad* (*Sercadis*) o prodotti affini alle cere quali *cyflufenamid* (*Cidely, Rebel Top*), *metrafenone* (*Vivando, Nabucco, Vulpin*), *trifloxystrobin* (*Flint*).

FLAVESCENZA DORATA: a fine fioritura effettuare il primo intervento obbligatorio (***vedi box***) contro lo scafoideo con prodotti ammessi dal disciplinare quali ***acetamiprid*** (*es. EpiK*), ***flupyradifurone*** (es. *Sivanto*), ***deltametrina*** *(es. Decis EVO)*, ***lambda-cialotrina*** *(es. Ninja)* o quelli ammessi in BIO riportati sotto, **attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di etichetta del prodotto utilizzato.** Elenco dei commerciali ammessi al link: https://tinyurl.com/RLcommscafoideo. Sono inoltre disponibili, a cura del Servizio fitosanitario nazionale, le **linee guida per il contrasto della flavescenza dorata** al link: https://www.protezionedellepiante.it/lineeguida.pdf

TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA — Modeste al momento le catture, ad eccezione delle aree di Soldano e Bordighera, in cui si rileva un aumento di catture di tignola rigata.

AZIENDE BIOLOGICHE: si consiglia di mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di rame e zolfo bagnabile o liquido. In alternativa o a integrazione del rame e dello zolfo si possono utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti (*COS-OGA e Cerevisane*). In presenza di bagnature prolungate con vitigni sensibili a marciumi è possibile abbinare a rame e zolfo formulati compatibili a base di bicarbonato di potassio e bicarbonato di sodio. Per la lotta a flavescenza dorata, è possibile utilizzare prodotti a base di piretro dopo il tramonto (acidificando leggermente la soluzione), di *azadiractina* (es. *Oikos*), sali potassici di acidi grassi (es. *Flipper*) e *olio di arancio* (es. *Prev-AM Plus*).

COMUNICAZIONI - Decreto dirigenziale n. 8271-2025 e Indicazioni tecniche per la lotta alla flavescenza dorata predisposte dal Settore Fitosanitario Regionale consultabili al link: https://www.agriligurianet.it/it/flavescenzadorata

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP) - **tel.** 0187.278768
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot