Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 13 del 04/06/2026 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza


GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 07/06/2026	Soleggiato, aumento della nuvolosità sui rilievi nel pomeriggio con locali piovaschi	Stazionarie o in lieve aumento
LUNEDÌ 08/06/2026	Soleggiato, addensamenti pomeridiani sui rilievi con rovesci sparsi	In deciso aumento

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le temperature massime hanno avuto un andamento piuttosto altalenante, registrando un calo progressivo di circa 3°C dal 29/5 sino ai giorni 2-3 giugno; andamento inizialmente più lineare per le temperature minime, con una diminuzione a fine periodo, anche in questo caso di circa 3°C rispetto ai valori iniziali. Piogge più consistenti a Ranzo in data 28/5, che hanno superato i 10 mm, e a Dolceacqua in data 2/6 (8,6 mm).

FENOLOGIA—*rilievi del 01/06*



In **costa** la fase prevalente è la BBCH73, in cui gli acini hanno raggiunto la misura del **grano di pepe**. Nelle **aree più interne** alcuni vitigni stanno concludendo la fioritura, ma si osserva prevalentemente la fase di **allegagione** (BBCH71). Nelle aree **montane** è iniziata la fioritura.
Foto Agt. Passaniti: Ormeasco a Pornassio



Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE
Il **Decreto dirigenziale n. 8271-2025** ha aggiornato, sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata, le **aree delimitate** in cui devono essere adottate misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite; le aree sono così costituite: una **zona infestata** e una **zona cuscinetto** adiacente e circostante la zona infestata con un'estensione di 500 metri di raggio. Nella provincia di Imperia il Decreto **non prevede ulteriori Comuni** in cui effettuare il trattamento; l'area individuata comprende infatti i Comuni già precedentemente indicati: **Caravonica, Ceriana, Chiusavecchia, Olivetta San Michele, Pornassio**.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA, TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:
- https://tinyurl.com/RLoidio
- http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta
- https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:
- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA PERONOSPORA: attualmente non sono stati rilevati sintomi di peronospora; in costa il rischio è basso, si consiglia di verificare le condizioni meteo e intervenire soprattutto in previsioni di piogge con prodotti a base di rame, abbinando prodotti con buona affinità alle cere quali *ametoctradina, cyazofamid, mandipropamide e zoxamide (Enervin, Electis R Flow, Pergado).* Nelle zone interne coloro che hanno trattato prima dell'entrata in fioritura devono intervenire nuovamente con miscele di sali di rame e principi attivi a maggiore persistenza quali *fosfiti/fosfonati, metalaxil-M, ametoctradina, zoxamide, cyazofamid, oxathiapiprolin.* Nelle zone montane si consiglia di attendere la fine della fioritura.
OIDIO: le condizioni attuali risultano favorevoli allo sviluppo del patogeno e si sono osservati **sporadici sintomi** su foglia. Si consiglia quindi di rispettare gli intervalli tra un trattamento e il successivo, aumentare il dosaggio dello zolfo bagnabile o liquido con eventuale abbinamento ad antioidici ad azione sistemica come gli *IBE* o prodotti con elevata affinità alle cere quali: *cyflufenamid (Cidely, Rebel Top), metrafenone (Vivando, Nabucco, Vulpin), trifloxystrobin (Flint)* .
FLAVESCENZA DORATA: **a fine fioritura** effettuare il primo intervento obbligatorio (***vedi box***) contro lo scafoideo con prodotti ammessi dal disciplinare quali ***acetamiprid*** (*es. EpiK*), ***flupyradifurone*** (es. *Sivanto*), ***deltametrina*** *(es. Decis EVO)*, ***lambda-cialotrina*** *(es. Ninja)* o quelli ammessi in BIO riportati sotto, **attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di etichetta del prodotto utilizzato**. Elenco dei commerciali ammessi al link: **https://tinyurl.com/RLcommscafoideo**. Sono inoltre disponibili, a cura del Servizio fitosanitario nazionale, le **linee guida per il contrasto della flavescenza dorata** al link: **https://www.protezionedellepiante.it/lineeguida.pdf**
TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA — Modeste le catture.
AZIENDE BIO: Contro oidio è importante mantenere la protezione utilizzando zolfo in polvere o bagnabile, quest'ultimo con eventuale abbinamento ad *olio di arancio dolce* (*Prev-AM Plus, Oro quin oppure Limocide*). In alternativa o in abbinamento allo zolfo si segnalano il complesso di oligosaccaridi *COS-OGA* (*Ibisco*), l'induttore di resistenza composto da alga *Laminarina* (*Vacciplant*) oppure alcuni prodotti biostimolanti (*Resolve*). Contro peronospora intervenire sempre in previsioni di eventuali piogge con Sali di rame.

POTATURA VERDE— considerando il forte sviluppo vegetativo si raccomanda di concludere le operazioni di **sistemazione** della vegetazione e di **cimatura**, arieggiando la fascia grappolo mediante **sfogliatura** (le foglie poste in ombra) e procedendo alla **sfemminellatura**; queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

COMUNICAZIONI - Decreto dirigenziale n. 8271-2025 e Indicazioni tecniche per la lotta alla flavescenza dorata predisposte dal Settore Fitosanitario Regionale consultabili al link: https://www.agriligurianet.it/it/flavescenzadorata

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP)
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot