

BOLLETTINO VITE n° 24 del 20/08/2026 - IMPERIA

ANDAMENTO METEO

Le condizioni meteo dell'ultima settimana sono state caratterizzate da **temperature** in diminuzione **e precipitazioni concentrate tra il 15 e il 17/08**. I grafici a destra evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relative alle **stazioni meteo** che hanno registrato i **dati più elevati** nei diversi areali provinciali (costa -primo entroterra, interno e aree montane). Previsioni meteo disponibili al link: https://tinyurl.com/previsioniARPAL





MATURAZIONE UVE *(prelievi del 17/08/26)*

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI -°Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		17/08/26	18/08/25	17/08/26	18/08/25	17/08/26	18/08/25	17/08/26	18/08/25
Diano Castello	Vermentino	23,2	25,9	13,6	15,4	5,05	6,36	3,22	3,33
Dolceacqua	Pigato	17,7	15,4	9,9	8,3	8,24	12,73	2,96	2,90
	Rossese	21,9	19,4	12,7	11	6,89	9,40	3,17	3,13
Pontedassio	Pigato	20,2	18,5	11,5	10,4	6,45	7,86	3,23	3,14
	Vermentino	19,0	19,2	10,7	10,9	5,63	7,62	3,17	3,13
Pornassio	Ormeasco	17,8	13,5	9,9	7,1	6,42	12,17	3,09	2,93
Ranzo	Pigato	18,9	18,3	10,7	10,2	6,41	9,27	3,23	3,14
Soldano	Rossese	20,4	22,9	11,7	13,4	5,36	6,79	3,34	3,34
MEDIA		19,9	19,1	11,34	10,84	6,31	9,03	3,18	3,13

Nelle ultime due settimane si è rilevato un progresso nella maturazione, evidenziato da un incremento del contenuto in zuccheri in media di +5,2 °Brix e un marcato calo dell'acidità media di -7,22 g/l. **Rispetto ai valori riscontrati nel 2025** emerge in media una maggiore concentrazione degli zuccheri (+0,8 °Brix) ed un valore inferiore di acidità (-2,72 g/l), con situazioni differenti a seconda di area e vitigno e alcuni valori in controtendenza, per gli effetti del prolungato stress idrico.
Le differenze maggiori si riscontrano, relativamente al tenore di zuccheri, nell'*Ormeasco* di Pornassio (+4,3°Brix) e nel *Rossese* di Dolceacqua (+2,5°Brix). Per quanto riguarda l'acidità il valore inferiore nel 2026 è stato registrato nel *Vermentino* di Diano Castello (5,05 g/l) che rappresenta nel complesso la situazione più avanzata, con alcol probabile pari a 13,6%; nel confronto delle acidità tra le annate 2026 e 2025 si è rilevata la maggior differenza nell'*Ormeasco* a Pornassio (-5,75 g/l rispetto al 2025) seguito dal *Pigato* a Dolceacqua (-4,49 g/l).
In generale è possibile osservare una **rapida riduzione dell'acidità** con incremento di pH in tutte le aree; qualora le **acidità dovessero calare eccessivamente**, raggiungendo livelli rischiosi per la stabilità del vino in particolare nei vitigni bianchi, **è opportuno valutare la possibilità di procedere alle raccolte**. Si ricorda che è possibile effettuare analisi delle uve pre-vendemmia anche presso il **Laboratorio Regionale di Sarzana (Pallodola),** che fornisce un servizio specifico per determinare il grado di maturazione delle uve (per maggiori informazioni:https://tinyurl.com/RLanalisi).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA - Nelle **zone montane** in previsione di piogge è possibile intervenire con rame e prodotti di biocontrollo.
DROSOPHILA—(*Drosophila suzukii*) nelle aree costiere e interne su *Rossese* e su vitigni a bacca rossa con buccia sottile, si consiglia di verificare le infestazioni ed eventualmente utilizzare *Deltametrina* in trappole "Attract and Kill". Per maggiori informazioni su *Drosophila suzukii* consultare la scheda al link http://bit.ly/Dsuzukii
TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - Catture in generale diminuzione, ma ancora elevate in alcune aree a seguito di aumento di umidità e flessione delle temperature. Valutare il periodo di raccolta e, se posticipato, si consiglia di intervenire utilizzando preferibilmente *Bacillus thuringiensis*. Andamento disponibile al link: https://tinyurl.com/RLcattureIM. **Schede tecniche al link**: https://bit.ly/RL-tignoletta - https://tinyurl.com/RLtignolarigata. **Commerciali ammessi al link**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta - https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
BOTRITE e MARCIUMI - vista la fase fenologica particolarmente sensibile e l'aumento delle condizioni di umidità, soprattutto nei grappoli danneggiati da tignoletta o a seguito di scottature, si consiglia di intervenire preferendo l'utilizzo di prodotti naturali preventivi (es. *Botector New*, *Taegro, Serenade Aso*, *Amylo-x)* o induttori di resistenza (*Cerevisane*) con tempi di carenza brevi. **Scheda Botrite** https://tinyurl.com/botrite **Commerciali ammessi:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite