Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 4 del 02/04/2026 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza

GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 05/04/2026	Soleggiato, addensamenti di nubi basse dal pomeriggio	Minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo
LUNEDÌ 06/04/2026	Alternanza di schiarite e addensamenti di nubi basse	Stazionarie o in lieve calo

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le temperature massime hanno avuto un andamento oscillante, con un aumento significativo in data 29/3, in cui si sono raggiunti 18-19°C, seguito da un ulteriore calo a fine periodo in esame, in cui i valori sono rimasti compresi tra i 14 e i 16°C. Minime anch'esse altalenanti, in particolare nell'areale lunense, con valori che in data 28/3 hanno toccato i 3°C per poi aumentare nuovamente fino a 9°C a fine periodo. Precipitazioni praticamente assenti.

FENOLOGIA—*rilievi del 30/03*

Nelle **aree costiere** e di **primo entroterra** le temperature miti e la disponibilità idrica hanno favorito la ripresa vegetativa; la fase fenologica prevalente per i principali vitigni bianchi è compresa tra foglie riunite in rosetta e prime foglioline distese (BBCH10-11), mediamente in linea con la precedente annata. I principali rossi (*Sangiovese, Merlot*) evidenziano invece una situazione più avanzata, in cui si osservano due foglie distese (BBCH12) e i primordi di grappolini. In **Val di Magra** il *Vermentino* presenta in prevalenza le foglie riunite in rosetta (BBCH 10), salvo alcune zone più favorevoli in cui appaiono già le prime foglioline distese, mentre nei principali rossi si osservano già 2—3 foglie distese (BBCH 12-13) e i primordi di grappoli. Nelle **aree interne** è appena iniziato il germogliamento (BBCH 9-10), analogamente a quanto rilevato nella precedente annata.




Foto CAAR: Merlot a Levanto a sx e Vermentino a Sarzana a dx





La **scala fenologica BBCH** è una scala internazionale di riferimento che è ripartita, per ogni specie vegetale, in 10 stadi principali: dal germogliamento/ripresa vegetativa alla fine del ciclo vegeto produttivo della specie in considerazione. Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

IN CAMPO

GESTIONE INFESTANTI

Il cotico erboso, particolarmente utile in collina e nelle aree in pendenza, consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e trattenere l'acqua, di incrementare la sostanza organica dei suoli e ridurre l'erosione, stabilizzando il terreno e migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi. Il controllo delle infestanti può avvenire mediante mezzi meccanici, quali sfalci e trinciature o altri mezzi non chimici (es. pirodiserbo) nel sottofila. Coloro che hanno seminato specie da sovescio possono trinciare nella fase della fioritura e, dopo 24-48 ore, interrare. Nell'ambito della produzione **integrata**, il ricorso al mezzo chimico è da ritenersi l'ultima soluzione ed eventualmente deve essere attuato come previsto dal Disciplinare, utilizzando i principi attivi ammessi con le relative limitazioni. Si ricorda che chi aderisce all'intervento **SRA-ACA5,** che prevede incentivi per il mantenimento dell'inerbimento (**parziale o totale)** delle colture arboree, deve attenersi a specifici impegni, che prevedono in particolare il **divieto di lavorazione del suolo** ed **il divieto di diserbo chimico**.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

OIDIO ed ESCORIOSI: nei vigneti con significativa presenza di escoriosi o nei vitigni particolarmente sensibili a oidio e in presenza di inoculo già visibile sui tralci (vedi foto), è consigliabile effettuare un trattamento con zolfo ad alto dosaggio dalla fase BBCH 8 (apertura gemme), da ripetersi a distanza di 7-10 giorni.

PERONOSPORA: questa settimana i germogli non sono ancora ricettivi e, sebbene la fenologia stia progredendo rapidamente, non dovrebbero verificarsi nei prossimi giorni precipitazioni tali da favorire l'avvio di eventuali infezioni.

NOTTUE: sono farfalle le cui larve si nutrono delle gemme di vite, risalendo dal terreno durante la notte. E' opportuno tenere sotto controllo eventuali zone predisposte e già attaccate negli anni precedenti. Il danno avviene dalla fase di gemme cotonose (BBCH 5) alla fase di spiegamento prima foglia (BBCH 11). Tra le pratiche per la difesa è possibile posizionare anelli di plastica rovesciati ben aderenti al tronco in modo che non vi sia spazio per il passaggio delle larve. Sono sconsigliati interventi chimici.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDA TECNICA OIDIO della VITE** e **PERONOSPORA della VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link: https://tinyurl.com/RLoidio e http://bit.ly/RLperonospora

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Escoriosi: https://tinyurl.com/RLcomescoriosi
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora

COMUNICAZIONI - Disciplinari di Produzione Integrata 2026 scaricabili al link https://www.agriligurianet.it/disciplinari26

- Autorizzazioni per l'impianto di nuovi vigneti: Proroga termine ultimo per la presentazione domande di nuove autorizzazioni 2026. Info al link https://www.agriligurianet.it/autorizzazioni nuovi impianti

- Complemento regionale per lo sviluppo rurale - CSR 2023-2027: bandi aperti disponibili al link https://tinyurl.com/CSRbandiaperti

- Vinitaly 2026 dal 12 al 15 aprile a Verona**. Info al link** https://www.vinitaly.com/

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP) - **tel.** 0187.278756
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot