Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 12 del 28/05/2026 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza

GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 31/05/2026	Soleggiato con qualche velatura	Minime in aumento, massime in calo
LUNEDÌ 01/06/2026	Nubi irregolari	In calo


Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Le temperature massime hanno registrato un deciso aumento: in costa si è passati da 24 a 32°C, in val di Magra da 27 a 34°C; su tutti gli areali vi è poi stata una diminuzione in data 27/5. Lo stesso è avvenuto per le minime in costa, passate da 15 a 24°C e successivamente diminuite sino a 20°C; a Luni, invece, l'aumento è stato costante e ha portato i valori da 12 a 18°C. Precipitazioni assenti.

FENOLOGIA—*rilievi del 25/05*

Le elevate temperature del periodo hanno decisamente favorito il progresso fenologico: nell'**areale costiero** e di **primo entroterra** è iniziata l'allegagione (BBCH 71) e i vitigni bianchi precoci (*Bosco*) e i principali rossi (*Sangiovese* e *Merlot*) mostrano, in parte, acini già della misura di





un grano di pepe (BBCH 73). Anche in **Val di Magra** si osserva una situazione analoga alla costa; nelle **aree interne** alle quote più alte, invece, la fioritura è nel pieno della fase per i principali rossi (BBCH 65) mentre nel *Vermentino* risulta in uno stadio ancora iniziale.
Foto CAAR: Merlot a Levanto
Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Il **Decreto dirigenziale n. 8271-2025** ha aggiornato, sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata, le **aree delimitate** in cui devono essere adottate misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite; le aree sono così costituite: una **zona infestata** e una **zona cuscinetto** adiacente e circostante la zona infestata con un'estensione di 500 metri di raggio. Nella provincia della Spezia il Decreto **non prevede ulteriori Comuni** in cui effettuare il trattamento; l'area individuata comprende infatti i Comuni già precedentemente indicati: **Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Levanto, Luni, Monterosso al Mare, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure.**

COMUNICAZIONI - Decreto dirigenziale n. 8271-2025 e Indicazioni tecniche per la lotta alla flavescenza dorata predisposte dal Settore Fitosanitario Regionale consultabili al link: https://www.agriligurianet.it/it/flavescenzadorata

- Intervento settoriale per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi - 2026/2027: Info al link: https://tinyurl.com/promozionevino

- Complemento regionale per lo sviluppo rurale - CSR 2023-2027: bandi aperti disponibili al link https://tinyurl.com/CSRbandiaperti

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA In costa si continuano ad osservare i danni causati dai venti molto forti e prolungati dei giorni 15 e 16 maggio, che hanno determinato bruciature della vegetazione e lessature e necrosi delle infiorescenze maggiormente esposte.

PERONOSPORA: negli areali a fenologia più avanzata il rischio di nuove infezioni a danno dei grappoli, considerando la fase di rapido accrescimento degli acini, è ormai molto basso. E' sufficiente quindi in area litoranea ripristinare la protezione, in caso di pioggia o bagnatura fogliare prolungata, con prodotti di copertura rameici; nelle aree più interne, a fenologia più arretrata, è preferibile associare al rame prodotti di maggiore persistenza (*es. oxathiapiprolin, ametoctradina, zoxamide - Electis R Flow, Enervin, Orondis*).

OIDIO: ci troviamo in una fase particolarmente sensibile al patogeno; è opportuno quindi mantenere protetta la vegetazione con zolfo bagnabile preferibilmente associato a prodotti specifici e persistenti con elevata affinità alle cere, quali *fluxapyroxad, strobilurine, cyflufenamid* e *metrafenone* (*Sercadis, Quadris, Cidely, Vivando*), tenendo sempre presente il principio dell'**alternanza** delle sostanze attive in base al diverso meccanismo d'azione.

FLAVESCENZA DORATA: **a fine fioritura** effettuare il primo intervento obbligatorio (***vedi box***) contro lo scafoideo con prodotti ammessi dal disciplinare quali ***acetamiprid*** (*es. EpiK*), ***flupyradifurone*** (es. *Sivanto*), ***deltametrina*** *(es. Decis EVO)*, ***lambda-cialotrina*** *(es. Ninja)* o quelli ammessi in BIO riportati sotto, **attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di etichetta del prodotto utilizzato**. Elenco dei commerciali ammessi al link: https://tinyurl.com/RLcommscafoideo. Sono inoltre disponibili, a cura del Servizio fitosanitario nazionale, le **linee guida per il contrasto della flavescenza dorata** al link: https://www.protezionedellepiante.it/lineeguida.pdf

TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA — ad inizio maggio sono state posizionate le trappole di *Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella e Cryptoblabes gnidiella.* Praticamente nulle al momento le catture.

AZIENDE BIO: vista la sensibilità della fase fenologica attuale, evitando i trattamenti in fioritura, mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di rame e zolfo bagnabile o liquido. In alternativa o a integrazione del rame e dello zolfo si possono utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti (*COS-OGA e Cerevisane*). In presenza di bagnature prolungate con vitigni sensibili a marciumi è possibile abbinare a rame e zolfo formulati compatibili a base di **bicarbonato di potassio** e **bicarbonato di sodio**.

Per la lotta a flavescenza dorata, è possibile utilizzare prodotti a base di *piretro* dopo il tramonto (acidificando leggermente la soluzione), di *azadiractina* (es. *Oikos*), *sali potassici di acidi grassi* (es. *Flipper*) e *olio di arancio* (es. *Prev-AM Plus*), quest'ultimo utilizzato anche nella difesa antioidica e antiperonosporica.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO, PERONOSPORA, TIGNOLETTA, TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:
- https://tinyurl.com/RLoidio
- http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta
- https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:
- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP) - **tel.** 0187.278768
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot