Cofinanziato dall'Unione europea


Piano Strategico della PAC 2023/2027—Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria
Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

REGIONE LIGURIA

BOLLETTINO VITE n° 17 del 02/07/2026 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



Tendenza

GIORNO	PREVISIONI	TEMPERATURE
DOMENICA 05/07/2026	Sereno, addensamenti pomeridiani sui rilievi	Stazionarie
LUNEDÌ 06/07/2026	Soleggiato con aumento della nuvolosità bassa da metà giornata	Stazionarie

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Temperature massime in diminuzione dal 27/6, con valori che da 35-36°C sono passati a 32°C. A Levanto si registra un calo delle minime più accentuato rispetto alle altre stazioni, da 24 a 20°C, in data 1/7. Precipitazioni modeste, che non hanno superato i 2 mm di cumulato.

FENOLOGIA—*rilievi del 29/06*

La fase di chiusura grappolo è da considerarsi completata nell'**areale costiero** e di **primo entroterra**, compresa la **Val di Magra**: i grappoli hanno raggiunto la dimensione definitiva in tutti vitigni e appaiono serrati nelle varietà come *Albarola* e *Sangiovese*; in quest'ultimo, nelle situazioni più avanzate, si sono osservati sporadici segni di invaiatura. Nelle **aree interne** il *Sangiovese* si approssima a completare la chiusura, il *Merlot* e il *Vermentino* appaiono leggermente più arretrati ma hanno comunque raggiunto la fase BBCH 77.






Foto CAAR: Merlot a Levanto

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Il **Decreto dirigenziale n. 8271-2025** ha aggiornato, sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata, le **aree delimitate** in cui devono essere adottate misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite; le aree sono così costituite: una **zona infestata** e una **zona cuscinetto** adiacente e circostante la zona infestata con un'estensione di 500 metri di raggio. Nella provincia della Spezia il Decreto **non prevede ulteriori Comuni** in cui effettuare il trattamento; l'area individuata comprende infatti i Comuni già precedentemente indicati: **Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Levanto, Luni, Monterosso al Mare, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure.**

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO**, **PERONOSPORA**, **TIGNOLETTA**, **TIGNOLA RIGATA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2026. Link:
- https://tinyurl.com/RLoidio - http://bit.ly/RLperonospora
- https://bit.ly/RL-tignoletta - https://tinyurl.com/RLtignolarigata
- https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei **commerciali ammessi**:
- **Oidio**: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- **Peronospora**: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- **Tignoletta**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- **Tignola rigata**: https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata
- **Botrite:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

OIDIO: in costa, in caso di flessione delle temperature si consiglia di intervenire con zolfo bagnabile preferibilmente abbinato a prodotti specifici, soprattutto in caso di vitigni sensibili, ad esempio *metrafenone, strobilurine, IBE, fluxapyroxad (Vivando, Sercadis, Tucana)*. Nelle aree interne in cui si sono verificate precipitazioni si consiglia di intervenire con zolfo bagnabile abbinato al trattamento antiperonosporico.

PERONOSPORA: in costa e nelle aree interne in assenza di sintomi il rischio rimane basso, per il perdurare di condizioni stabili; si consiglia quindi di intervenire con rame a basso dosaggio in associazione al trattamento antioidico. Invece nelle aree interne in presenza di sintomi e nel caso in cui si siano verificate piogge significative, è opportuno utilizzare rame preferibilmente in associazione ad un prodotto curativo, come *cimoxanil (Curzate Erre Evo).*

FLAVESCENZA DORATA: in questo periodo **è obbligatorio eseguire il secondo trattamento contro lo scafoideo** nei ***Comuni*** indicati nel box giallo, utilizzando i principi attivi ammessi dal Disciplinare, quali ***acetamiprid*** (es. *Epik SL*), ***etofenprox*** (es. *Trebon up*), ***flupyradifurone*** (*Sivanto*) avendo cura di bagnare bene anche la parte bassa delle piante. Elenco dei commerciali ammessi al link: https://tinyurl.com/RLcommscafoideo .

A salvaguardia degli insetti impollinatori, prima di intervenire, sfalciare le eventuali erbe spontanee sottostanti il vigneto 2-3 giorni prima del trattamento. Sono inoltre disponibili, a cura del Servizio fitosanitario nazionale, le **linee guida per il contrasto della flavescenza dorata** al link: https://www.protezionedellepiante.it/lineeguida.pdf

TIGNOLETTA, TIGNOLA e TIGNOLA RIGATA — L'andamento è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/RLcattureSP . Si ricorda che il secondo trattamento obbligatorio contro lo Scafoideo contribuisce anche al contenimento di tignoletta.

AZIENDE BIO: nelle aree interne in cui si sono verificate precipitazioni si consiglia di mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di rame (alle dosi più basse) e zolfo bagnabile o liquido. In alternativa, o a integrazione del rame e dello zolfo, anche per contrastare i marciumi del grappolo, si possono utilizzare prodotti **coadiuvanti** o **corroboranti** quali *zeolite, Cerevisane, COS-OGA e terpeni,* evitando le applicazioni nelle ore più calde della giornata. Per la lotta a flavescenza dorata, è possibile utilizzare prodotti a base di *piretro* dopo il tramonto (acidificando leggermente la soluzione), di *azadiractina* (es. *Oikos*), *sali potassici di acidi grassi* (es. *Flipper*) e *olio di arancio* (es. *Prev-AM Plus*), quest'ultimo utilizzato anche nella difesa antioidica e antiperonosporica.

SITUAZIONE IDRICA Si osserva in diverse aree un progressivo esaurimento delle riserve idriche; si consigliano interventi in terreni sciolti e medio impasto, secondo gli apporti disponibili al link https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php

- Decreto dirigenziale n. 8271-2025 e Indicazioni tecniche per la lotta alla flavescenza dorata predisposte dal Settore Fitosanitario Regionale consultabili al link: https://www.agriligurianet.it/it/flavescenzadorata

>> Dichiarato lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link https://tinyurl.com/Gravepericolositaincendi

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP)
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot