PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Cofinanziato dall'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LIGURIA
Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023 – 2027 —Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"


BOLLETTINO VITE n° 23 del 13/08/2026 - LA SPEZIA

ANDAMENTO METEO

Le condizioni meteo dell'ultima settimana sono state caratterizzate da **temperature molto elevate** ed **in aumento**, e **precipitazioni praticamente assenti,** fatta eccezione per i 9 mm registrati dalla stazione di Cuccarello.

Il grafico a destra evidenzia l'andamento settimanale delle temperature massime relative alle **stazioni meteo** che hanno registrato i **dati più elevati** nei diversi areali provinciali (costa-primo entroterra ed interno).

Previsioni meteo disponibili al link: https://tinyurl.com/previsioniARPAL



MATURAZIONE UVE - *CONFRONTO ANNATE*

		ZUCCHERI - °Brix								ACIDITA' TOTALE - g/l							
COMUNE	VITIGNO	2026	Med 20-25	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2026	Med 20-25	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Arcola	*Sangiovese*	**18,7**	**14,9**	16,3	13,2	15,5	19,5	12,1	12,9	**9,19**	**13,90**	12,06	12,59	13,5	9,16	21,35	14,75
	Vermentino	**17,5**	**12,4**	14,9	12,4	14,2	15,8	8,2	9,1	**7,83**	**17,04**	14,09	13,04	10,9	9,59	32,4	22,22
Bolano	*Merlot*	**18,2**	**11,6**	13,7	7,8	12,4	19,6	6,8	9,5	**10,23**	**23,50**	17,76	29,52	22,17	10,29	36,35	24,9
	Sangiovese	**18,4**	**11,8**	13,3	10,2	11,7	17,9	7,1	10,6	**10,07**	**21,66**	18,66	22,34	25,21	8,74	34,04	20,99
	Vermentino	**16,4**	**9,9**	10,2	9,1	11,2	17	5,4	6,6	**12,84**	**26,78**	28,51	25,64	24,11	10,17	37,58	34,66
Castelnuovo M.	*Vermentino*	**17,6**	**12,4**	14,5	15	12,7	16,2	6,3	9,8	**7,76**	**18,83**	15,23	9,57	16,44	9,76	35,87	26,11
Levanto	*Albarola*	**13,3**	**13,0**	16	10,7	15,4	16	8,7	10,9	**7,44**	**13,21**	10,45	13,74	7,66	6,07	27,51	13,83
	Merlot	**16,2**	**15,0**	16	14,6	15,3	21,3	11,1	11,9	**10,00**	**14,06**	11,94	12,46	12,92	7,09	23,64	16,29
	Sangiovese	**17,3**	**15,5**	15,3	14,6	17,4	19,2	11,8	14,4	**9,40**	**14,13**	14,38	15,47	12,43	8,23	21,92	12,34
	Vermentino	**17,3**	**14,3**	16,3	13,4	13,5	18,1	11,6	12,8	**6,06**	**12,81**	10,81	11,16	12,94	6,04	21,93	13,95
Luni	*Merlot*	**19,8**	**16,9**	17,7	16,8	17,3	21,8	13,1	14,7	**7,89**	**11,47**	9,65	8,33	12,64	8,82	18,02	11,33
	Vermentino	**16,6**	**12,8**	14,2	13,6	13,1	16,4	9,3	9,9	**5,95**	**14,56**	11,59	9,29	14,46	7,5	26,52	17,98
Riomaggiore - Manarola	*Albarola*	**16,5**	**12,1**	13,5	11,9	12,9	15,4	7,6	11,5	**6,83**	**15,28**	15,85	13,78	11,23	7,07	29,16	14,6
	Bosco	**16,7**	**13,6**	12,9	14,6	13,9	17,5	9,7	13	**10,5**	**16,74**	18,31	12,17	16,64	8,29	27,76	17,24
Riomaggiore - Parco	*Albarola*	**13,1**	**12,9**	13,2	13,9	13,5	17,2	7,7	11,9	**10,26**	**13,73**	15,47	10,44	12,19	6,11	24,51	13,68
	Bosco	**17,6**	**16,4**	16,9	16,8	16,8	21,0	11,3	15,7	**5,87**	**9,94**	9,72	7,19	8,55	5,63	18,63	9,94
	Vermentino	**17,1**	**15,2**	16,8	16,1	13,9	17,5	11,7	15,4	**7,94**	**10,81**	9,29	7,86	10,27	7,55	20,36	9,52
S. Stefano M.	*Vermentino*	**17,2**	**14,0**	16,2	13,3	14,5	17,6	10,3	12,2	**6,81**	**11,00**	7,83	9,11	9,69	6,88	20,62	11,89
Sarzana	*Sangiovese*	**18,3**	**15,6**	17,1	15,5	14,6	19,4	12,1	14,8	**8,56**	**12,72**	10,86	11,13	13,84	8,14	20,27	12,09
	Vermentino	**17,7**	**12,9**	14,5	12,8	13,5	17,2	8,6	10,7	**6,95**	**14,98**	13,53	13,02	10,65	7,63	26,93	18,1
Valori Medi >		**17,1**	**13,7**	**15,0**	**13,3**	**14,2**	**18,1**	**9,5**	**11,9**	**8,42**	**15,36**	**13,80**	**13,39**	**13,92**	**7,94**	**26,27**	**16,82**

I dati di maturazione rilevati il 03/08/26 sono stati confrontati con le annate precedenti fino al 2020. Dal confronto emerge un **accumulo degli zuccheri superiore alla media delle sei annate precedenti di 3,4°Brix**; analizzando le singole annate, solo nel 2022, nota come **annata particolarmente calda e siccitosa, si è rilevato un dato superiore** al 2026 (+1°Brix), ma occorre tenere conto che i prelievi sono stati eseguiti in data **08/08/2022**, quindi **5 giorni** dopo rispetto ai prelievi di quest'anno. Per quanto riguarda **l'acidità totale**, nel 2026 risulta inferiore di 6,94 g/l rispetto alla media delle precedenti annate, e solo nel 2022 si era osservato un valore ancora più basso di circa 0,5 g/l. Considerando i **singoli vitigni**, le maggiori differenze si possono rilevare a **Bolano**, con *Merlot* e *Sangiovese* che mostrano un contenuto zuccherino superiore di 6,6°Brix rispetto alla media delle precedenti annate e il *Vermentino* con 6,5°, per i quali emergono rilevanti differenze anche a livello di acidità. Segue il *Vermentino* sia a *Castelnuovo M.* che ad *Arcola*, in cui si rileva un valore di zuccheri superiore di oltre 5°Brix. In generale si osserva un **deciso anticipo** rispetto all'anno scorso con situazioni già **potenzialmente prossime alla raccolta** ma, per quanto concerne le prospettive di maturazione e la possibile data di vendemmia, oltre al clima bisogna tenere conto di diversi aspetti quali gestione del vigneto, quota ed esposizione, vitigno, suolo, stato fitosanitario e carica produttiva. Nelle **prossime settimane** con i nuovi dati delle analisi delle uve prelevate nei vigneti monitorati, che saranno riportati sul bollettino settimanale fino alla raccolta, si potranno avere indicazioni più precise.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

BOTRITE e MARCIUMI - vista la fase fenologica particolarmente sensibile, nelle varietà più a rischio e soprattutto con grappoli danneggiati, ad esempio da tignoletta o a seguito di scottature, si consiglia di ripetere il trattamento in previsione di piogge o di aumento delle condizioni di umidità, preferendo l'utilizzo di prodotti naturali preventivi (es. *Botector New*, *Taegro, Serenade Aso*, *Amylo-x)* o induttori di resistenza (*Cerevisane*) con tempi di carenza brevi. Per contenere marciumi già in atto su varietà a grappolo compatto è possibile utilizzare bicarbonato di potassio. **Scheda Botrite** https://tinyurl.com/botrite **Commerciali ammessi:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - soprattutto in area costiera l'elevata umidità sta favorendo l'attività dell'insetto a danno dei grappoli. Nelle varietà più sensibili con grappoli compatti, in caso di ritorno a condizioni climatiche più favorevoli ai fitofagi, si consiglia di intervenire nuovamente, utilizzando preferibilmente *Bacillus thuringiensis*, a distanza di 7-10 giorni dal precedente. Andamento catture al seguente link: **https://tinyurl.com/RLcattureSP**. **Schede tecniche al link**: **https://bit.ly/RL-tignoletta** - **https://tinyurl.com/RLtignolarigata**. **Commerciali ammessi al link**: **https://tinyurl.com/RLcomtignoletta** - **https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata** .

REGIONE LIGURIA—Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR—Loc. Pallodola, c/o Mercato 19038 Sarzana (SP)
e-mail caarservizi@regione.liguria.it – **Web** www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot
Autorità di Gestione CSR Liguria