PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Cofinanziato dall'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LIGURIA
Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023 – 2027 —Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"


BOLLETTINO VITE n° 23 del 13/08/2026 - SAVONA

ANDAMENTO METEO

Le condizioni meteo dell'ultima settimana sono state caratterizzate da **temperature** altalenanti, ma comunque **elevate,** e **precipitazioni praticamente assenti.**

Il grafico a destra evidenzia l'andamento settimanale delle temperature massime relative alle **stazioni meteo** che hanno registrato i **dati più elevati** nei diversi areali provinciali (costa-primo entroterra ed interno).

Previsioni meteo disponibili al link: https://tinyurl.com/previsioniARPAL.



MATURAZIONE UVE - *CONFRONTO ANNATE*

		ZUCCHERI - ° Brix								ACIDITA' TOTALE - g/l							
COMUNE	**VITIGNO**	**2026**	**Med 20-25**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2026**	**Med 20-25**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Albenga	*Pigato*	**12,0**	**11,1**	12,1	9,9	11,9	16,4	8,1	8,2	**15,34**	**18,92**	17,8	19,28	16,45	7,93	27,25	24,8
	Rossese	**13,8**	**9,8**	12,2	7,8	11,1	13,4	6,4	7,8	**10,15**	**21,27**	15,15	23,33	19,2	11,09	32,52	26,3
	Vermentino	**16,8**	**14,1**	15,7	13,5	16	17,8	10,4	11,4	**7,34**	**12,93**	12,01	11,13	9,57	5,99	22,38	16,5
Finale Ligure	*Barbarossa*	**15,7**	**10,1**	7,2	10	12,9	17,8	6	6,7	**7,86**	**21,84**	28,7	16,5	14,83	7,55	35,04	28,4
	Granaccia	**18,0**	**12,3**	13,3	12,6	14,5	18,9	8	6,2	**9,13**	**17,63**	14,96	15,86	12,61	7,54	29,52	25,3
	Vermentino	**14,5**	**11,5**	11,3	10,3	14,2	17,8	6,6	8,8	**10,29**	**20,06**	21,4	21,93	12,48	6,86	33,79	23,9
Noli	*Lumassina*	**10,3**	**7,2**	7,1	5,2	9,6	12	4,3	4,7	**20,68**	**32,49**	37,76	37,09	30,65	20,16	35,57	33,7
Ortovero	*Pigato*	**13,8**	**12,7**	15,9	12,9	13,5	16,8	8,1	8,9	**11,92**	**16,70**	12,13	13,71	13,61	7,98	30,07	22,7
Quiliano	*Granaccia*	**16,0**	**10,9**	14,1	8,7	12,1	18,2	6	6,1	**7,77**	**18,26**	14,12	20,39	13,63	5,82	30,4	25,2
	Lumassina	**10,2**	**6,5**	6,8	4,5	7	11,4	4,3	4,7	**25,97**	**34,32**	32,95	36,43	38,6	23,81	37	37,1
Valori Medi >		**14,1**	**10,6**	**11,57**	**9,54**	**12,3**	**16,1**	**6,8**	**7,4**	**12,65**	**21,44**	**20,70**	**21,57**	**18,16**	**10,47**	**31,35**	**26,4**

I dati di maturazione rilevati il 03/08/26 sono stati confrontati con le annate precedenti fino al 2020. Dal confronto emerge un accumulo degli zuccheri superiore alla media delle sei annate precedenti (+**3,5** °**Brix**) e solo nel 2022, nota come **annata particolarmente calda e siccitosa, si è rilevato un dato superiore** al 2026 **(+2°Brix),** ma occorre tenere conto che i prelievi sono stati eseguiti in data **08/08/2022**, quindi **5 giorni** dopo rispetto ai prelievi di quest'anno. Per quanto riguarda **l'acidità totale**, nel 2026 risulta inferiore di **8,8** g/l rispetto alla media delle precedenti annate, ma nel **2022** si era osservato un valore ancora più basso di circa 2,2 g/l. Considerando i singoli vitigni, le differenze più elevate si sono osservate nella ***Granaccia*** a Finale Ligure e a Quiliano, rispettivamente + 5,7 e +5,1°Brix rispetto alla media delle ultime annate, e nel vitigno ***Barbarossa*** a Finale (+5,6°Brix), per il quale si rileva anche la differenza più marcata a livello di acidità, pari a –13,98 g/l. In generale si osserva un **deciso anticipo** rispetto all'anno scorso ma, per quanto concerne le prospettive di maturazione e la possibile data di vendemmia, oltre al clima bisogna tenere conto di diversi aspetti quali gestione del vigneto, quota ed esposizione, vitigno, suolo, stato fitosanitario e carica produttiva. Nelle **prossime settimane,** con i nuovi dati delle analisi delle uve prelevate nei vigneti monitorati che saranno riportati sul bollettino settimanale fino alla raccolta, si potranno avere indicazioni più precise.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

DROSOPHILA—(*Drosophila suzukii*) per le aree costiere e interne su *Rossese* e su vitigni a bacca rossa con buccia sottile in fase fenologica di completa invaiatura, si consiglia di verificare le infestazioni ed eventualmente intervenire. Per maggiori informazioni su *Drosophila suzukii* consultare la scheda al link **http://bit.ly/Dsuzukii**

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - L'elevata umidità sta favorendo l'attività dell'insetto a danno dei grappoli. Nelle varietà più sensibili con grappoli compatti, si consiglia di intervenire nuovamente, utilizzando preferibilmente *Bacillus thuringiensis*, a distanza di 7-10 giorni dal precedente. Andamento disponibile al link: **https://tinyurl.com/RLcattureSV**. **Schede tecniche al link**: **https://bit.ly/RL-tignoletta** - **https://tinyurl.com/RLtignolarigata**. **Commerciali ammessi al link**: **https://tinyurl.com/RLcomtignoletta** - **https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata**

BOTRITE e MARCIUMI - **BOTRITE e MARCIUMI** - vista la fase fenologica particolarmente sensibile, nelle varietà più a rischio e soprattutto con grappoli danneggiati si consiglia di ripetere il trattamento in previsione di piogge o di aumento delle condizioni di umidità, preferendo l'utilizzo di prodotti naturali preventivi (es. *Botector New*, *Taegro, Serenade Aso*, *Amylo-x)* o induttori di resistenza (*Cerevisane*) con tempi di carenza brevi. Per contenere marciumi già in atto su varietà a grappolo compatto è possibile utilizzare bicarbonato di potassio. **Scheda Botrite** **https://tinyurl.com/botrite** **Commerciali ammessi:** **https://tinyurl.com/RLcommbotrite**