

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Cofinanziato dall'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LIGURIA
Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023 – 2027 —Intervento SRH06—"servizi di back office per l'AKIS"

BOLLETTINO VITE n° 24 del 20/08/2026 - SAVONA

ANDAMENTO METEO

Le condizioni meteo dell'ultima settimana sono state caratterizzate da **temperature** in **diminuzione e precipitazioni concentrate il 17/08**. I grafici a destra evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e delle precipitazioni relative alle **stazioni meteo** che hanno registrato i **dati più elevati** nei diversi areali provinciali (costa-primo entroterra ed interno). Previsioni meteo disponibili al link: https://tinyurl.com/previsioniARPAL





MATURAZIONE UVE *(prelievi del 17/08/26)*

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI -°Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		17/08/26	18/08/25	17/08/26	18/08/25	17/08/26	18/08/25	17/08/26	18/08/25
Albenga	*Pigato*	16,8	18,3	9,3	10,2	6,77	8,52	3,25	3,22
	Rossese	18,3	18,4	10,2	10,3	5,45	6,03	3,40	3,44
	Vermentino	20,1	22,9	11,5	13,4	4,76	6,12	3,30	3,45
Finale Ligure	*Barbarossa*	20,0	13,7	11,4	7,2	5,62	13,22	3,34	3,07
	Granaccia	21,1	19	12,2	10,7	6,25	8,25	3,20	3,21
	Vermentino	19,3	18,2	10,9	10,2	5,94	6,61	3,20	3,17
Noli	*Lumassina*	13,7	11,8	7,2	6	10,35	20,82	3,01	2,91
Ortovero	*Pigato*	17,2	21,8	9,5	12,6	6,66	6,6	3,19	3,4
Quiliano	*Granaccia*	18,8	19,1	10,6	10,8	5,52	6,97	3,37	3,33
	Lumassina	14,2	11,7	7,6	6	12,29	19,17	2,99	2,82
Medie		18,0	17,5	10,0	9,7	6,96	10,23	3,23	3,2

Nelle ultime due settimane si è avuto un buon **progresso** nella maturazione, evidenziato da un incremento del tenore di zuccheri in media di +3,8 °Brix e da un calo dell'acidità media di -5,68 g/l. **Rispetto ai valori riscontrati nel 2025** emerge in media una maggiore concentrazione degli zuccheri (+0,5 °Brix) ed un valore inferiore di acidità (-3,3 g/l), sebbene in alcune situazioni emerga una controtendenza, per gli effetti del prolungato stress idrico. Le differenze maggiori si riscontrano, relativamente al tenore di zuccheri, a Finale Ligure nella *Barbarossa* (+6,3°Brix) seguita dalla *Granaccia* (+2,1°Brix). Per quanto riguarda **l'acidità** i valori inferiori nel 2026 sono stati registrati nel *Vermentino* di Albenga (4,76 g/l) e nel confronto delle acidità tra le annate 2026 e 2025 si è rilevata la maggior differenza nella *Lumassina*, a Noli con -10,47 g/l rispetto al 2025 e a Quiliano con -6,88 g/l. La situazione più **avanzata** nel complesso è rappresentata dal *Vermentino* ad Albenga e dal vitigno *Barbarossa* a Finale Ligure, con alcol probabile intorno a 11,5%; al contrario nel vitigno *Lumassina* si osserva la concentrazione di zuccheri meno elevata, sebbene superiore rispetto ai valori rilevati nel 2025. In generale si è rilevata una **rapida riduzione dell'acidità** con incremento di pH in tutte le aree; qualora le **acidità dovessero calare eccessivamente**, raggiungendo livelli rischiosi per la stabilità del vino in particolare nei vitigni bianchi, **è opportuno valutare la possibilità di procedere alle raccolte anticipate**. Si ricorda che è possibile effettuare analisi delle uve prevendemmia anche presso il **Laboratorio Regionale di Sarzana (Pallodola),** che fornisce un servizio specifico per determinare il grado di maturazione delle uve (per maggiori informazioni:https://tinyurl.com/RLanalisi).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

DROSOPHILA—(*Drosophila suzukii*) nelle aree costiere e interne su *Rossese* e su vitigni a bacca rossa con buccia sottile, si consiglia di verificare le infestazioni ed eventualmente utilizzare *Deltametrina* in trappole "Attract and Kill". Per maggiori informazioni su *Drosophila suzukii* consultare la scheda al link http://bit.ly/Dsuzukii

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - Catture ancora elevate in alcune aree a seguito di aumento di umidità e flessione delle temperature. Valutare il periodo di raccolta e, se posticipato, si consiglia di intervenire utilizzando preferibilmente *Bacillus thuringiensis*. Andamento disponibile al link: https://tinyurl.com/RLcattureSV. **Schede tecniche al link**: https://bit.ly/RL-tignoletta - https://tinyurl.com/RLtignolarigata. **Commerciali ammessi al link**: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta - https://tinyurl.com/RLcomtignolarigata

BOTRITE e MARCIUMI - vista la fase fenologica particolarmente sensibile e l'aumento delle condizioni di umidità, soprattutto nei grappoli danneggiati da tignoletta o a seguito di scottature, si consiglia di intervenire preferendo l'utilizzo di prodotti naturali preventivi (es. *Botector New*, *Taegro, Serenade Aso*, *Amylo-x)* o induttori di resistenza (*Cerevisane*) con tempi di carenza brevi. **Scheda Botrite** https://tinyurl.com/botrite **Commerciali ammessi:** https://tinyurl.com/RLcommbotrite