

BOLLETTINO OLIVO IMPERIA – COMUNICATO N. 10 del 23 LUGLIO 2020



Prosegue l'accrescimento delle olive e la fase di indurimento del nocciolo è terminata nella maggior parte delle aree di fascia 1 e fascia 2, dove l'attività di **ovideposizione della mosca nelle aree non trattate la scorsa settimana risulta ancora limitata**. Le infestazioni attive rilevate sono inferiori alla soglia di intervento nella maggior parte degli areali e risultano costituite in prevalenza da uova e larve di prima età e in misura minore da larve di seconda età. La mortalità osservata a carico delle giovani larve, confermata anche dal modello in uso CAAR, ha contribuito a contenere le infestazioni attive, che solo **in fascia 2 ponente, alla quota 150-250m, superano la soglia di intervento**, fissata dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria nel 5-10%, rendendo **necessario intervenire con prodotti ad azione larvicida ammessi dal Disciplinare (sulla base del Decreto n. 4218 del 23/07/20 – <https://bit.ly/RLdec4218>)**, quali **dimetoato (ROGOR® L 40 ST 2020 o DIAMANT PLUS)**, **acetamiprid (es. EpiK SL)** o **fosmet (es. Spada)**. Si specifica che per quanto riguarda il dimetoato la soglia di intervento è del 10-15%. **Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO <https://bit.ly/RLmoscaolivo>**

Come già osservato la scorsa settimana, si evidenzia che possono ancora verificarsi **situazioni di infestazioni attive molto variabili anche tra oliveti dello stesso areale**, in funzione soprattutto della dimensione delle olive: l'osservazione diretta di punture sulle olive può aiutare a valutare l'effettiva importanza dell'infestazione in atto.

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE	fascia	quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento		
 FASCIA 1 COSTA	INTERA FASCIA	Quota 0-100 m TRATTATO 16/07	Quota 100-200 m TRATTATO 16/07	—
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	Quota 0-150 m 5% NON TRATTARE	Quota 150-250 m 2% NON TRATTARE	Quota 250-350 m 0% NON TRATTARE
	PONENTE	Quota 0-150 m 2% NON TRATTARE	Quota 150-250 m 8% TRATTARE	Quota 250-350 m NR: non rilevato
 FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	Quota 0-150 m NR: non rilevato	Quota 150-250 m NR: non rilevato	Quota 250-350 m NR: non rilevato
	PONENTE	Quota >350 NR: non rilevato		
 FASCIA 4 INTERNO	INTERA FASCIA	Fino a 250 m 0% NON TRATTARE	Quota 250-350 m NR: non rilevato	Quota >350 m NR: non rilevato

Per la corretta interpretazione del bollettino e della tabella riportante i dati di infestazione consultare la guida: <https://bit.ly/guida-im>

SITUAZIONE IDRICA

Le elaborazioni evidenziano situazioni di possibile stress idrico, in particolare in alcune zone costiere, sia nei terreni sabbiosi che in quelli a medio impasto. E' possibile consultare la situazione e gli apporti idrici consigliati, particolarmente necessari in caso di impianti recenti, accedendo a questo link <https://bit.ly/RLirrigazione>. Prima di intervenire con apporti irrigui è consigliabile verificare le previsioni meteo (<http://bit.ly/previsioniARPAL>) e tenere conto che le irrigazioni possono favorire le infestazioni da mosca.

>> DEROGA ALL'USO DEL DIMETOATO <<

La sostanza attiva **Dimetoato**, revocata ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1090 con obbligo di smaltimento scorte entro il 30/06/2020, con Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2020 (<https://tinyurl.com/dimetoato>) è stata autorizzata in deroga per la lotta alla mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).

A tal proposito si evidenzia che sono autorizzati soltanto i due prodotti commerciali ROGOR® L 40 ST 2020 e DIAMANT PLUS (max 2 interventi all'anno - validità etichetta dal 1 luglio al 28 ottobre 2020) e che tutti i prodotti a base di dimetoato autorizzati in precedenza non sono utilizzabili.

Il Decreto del Dirigente n. 4218 del 23/07/2020 (<https://bit.ly/RLdec4218>) autorizza in deroga l'uso del principio attivo dimetoato da parte delle aziende che aderiscono ai principi dell'agricoltura integrata (misura 10.1.A del PSR). La soglia di intervento fissata dal Decreto è del 10-15% di infestazione attiva con il limite di 2 interventi annui nell'ambito dei 4 interventi ad azione larvicida/curativa attualmente consentiti sulla coltura olivo.

METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO

Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto scaricabili al link <https://bit.ly/RLoliovibio>. Indicazioni specifiche per la difesa sono contenute nei comunicati (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx**), emessi a livello provinciale sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali. Il **comunicato BIO n. 3** è stato emesso venerdì 10 luglio ed è disponibile al seguente link: <https://tinyurl.com/ya758ef5>



Servizi informativi accessibili tramite Telegram
 Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale **informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo**. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizobot>

Il prossimo bollettino olivo sarà emesso giovedì 30 luglio