REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA - AMBITO OLIVICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO OLIVO IMPERIA—COMUNICATO N. 21 del 8 OTTOBRE 2020

Gli eventi meteorologici di venerdì 2 e sabato 3 sono stati caratterizzati da venti molto forti e precipitazioni molto intense, che oltre a frane, crolli di muretti e fenomeni erosivi hanno causato anche ingenti cascole di olive. Tali condizioni meteo non hanno tuttavia rallentato l'attività di ovideposizione della mosca e nelle aree non coperte da trattamento le infestazioni attive, costituite in prevalenza da uova e larve di prima età, sono aumentate, superando la soglia di intervento nelle aree evidenziate in rosso in tabella, **dove si consiglia di intervenire con prodotti ad azione larvicida ammessi dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria** (come modificato da Decreto n. 4218 del 23/07/20—https://bit.ly/RLdec4218), quali **dimetoato** (*ROGOR® L 40 ST 2020 o DIAMANT PLUS* entrambi con Intervallo di Sicurezza (IS) di 28 gg), **acetamiprid** (*EpiK SL* con IS di 21gg, *e Kestrel* con IS di 7 gg) o **fosmet** (es. *Spada, Suprafos, Imidan* tutti con IS pari a 21 gg) **prestando attenzione al numero massimo di interventi ammessi per i diversi principi attivi e al relativo tempo di carenza in relazione alla possibile data di inizio raccolta.** Si ricorda che per quanto riguarda il **dimetoato il Decreto regionale prevede la soglia di intervento del 10-15%. In alternativa al trattamento è possibile pianificare la raccolta precoce,** in funzione dell'intervallo di sicurezza dell'eventuale ultimo prodotto fitosanitario impiegato e tenendo conto delle possibili rese.

Ancora per questa settimana proseguono presso il laboratorio regionale di Sarzana le **determinazioni del contenuto in olio** su olive prelevate nella riviera di Levante e di Ponente, allo scopo di fornire indicazioni sullo stato di maturazione delle olive, utili per pianificare eventuali raccolte anticipate. Dalle analisi effettuate sui campioni prelevati in provincia della **Spezia, il contenuto medio in olio espresso sul peso fresco è risultato essere circa il 15,9% (min 13,1% max 19,2% e possibili rese al frantoio comprese tra il 8,7% e il 12,7%).**
Per quanto riguarda invece i dati relativi al Ponente, le analisi sui campioni prelevati **nell'imperiese** e ad **Albenga** rivelano un contenuto medio in olio sul peso fresco pari a **17,2% (min 13,3% max 20,7% e possibili rese al frantoio tra il 8,8% e il 13,6%).**
In questa settimana sono disponibili anche i primi dati relativi alle prime partite di olive frante. A La Spezia sono state ottenute rese comprese tra il 9% e il 15%; Genova 12,5% - 19%; Savona 13% - 17%; Imperia 8% - 17%.
Al fine di monitorare l'andamento della maturazione invitiamo i produttori a registrare le rese effettive che otterranno al frantoio nelle varie frangiture al link https://tinyurl.com/RLrese20

LOTTA GUIDATA *MOSCA OLEARIA* - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE	fascia	quota (m) – infestazione attiva (%) – consiglio di trattamento		
FASCIA 1 COSTA	INTERA FASCIA	**Quota 0-200 m TRATTATO 24/09 o IN RACCOLTA**		—
FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	**Quota 0-250 m TRATTATO 24/09 o IN RACCOLTA**		**Quota 250-350 m 7% TRATTARE O PREPARARSI ALLA RACCOLTA**
	PONENTE	**Quota 0-150 m TRATTATO 24/09 o IN RACCOLTA**	**Quota 150-250 m TRATTATO 17/09**	**Quota 250-350 m TRATTATO 24/09 o IN RACCOLTA**
FASCIA 3 ENTROTERRA	LEVANTE	**Quota 0-150 m >10% TRATTARE O PREPARARSI ALLA RACCOLTA**	**Quota 150-250 m 8% TRATTARE O PREPARARSI ALLA RACCOLTA**	**Quota 250-350 m** 3% NON TRATTARE
	PONENTE	**Quota >250 TRATTATO 24/09**		
 **FASCIA 4 INTERNO**	INTERA FASCIA	**Fino a 250 m** 5% NON TRATTARE	**Quota 250-350 m TRATTATO 24/09**	**Quota >350 m** 2% NON TRATTARE

Per la corretta interpretazione del bollettino e della tabella riportante i dati di infestazione consultare la guida: https://bit.ly/guida-im

BUONE PRATICHE DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE

È consigliabile raccogliere le olive direttamente dalla pianta e scartare le olive cadute a terra o in cattivo stato fitosanitario, avendo cura di **riporre il prodotto in strati sottili e in cassette forate** possibilmente in locali freschi, ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento e lontano da odori sgradevoli (stalla, gasolio e simili). **Si consiglia inoltre di prendere accordi con il frantoio prima della raccolta, prenotando la frangitura, in modo da frangere prima possibile (possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta).** Per preservare le caratteristiche dell'olio prodotto è importante **utilizzare contenitori in acciaio** o **vetro scuro, privi di odori, puliti** (con acqua calda e soda) **e asciutti e mantenerli colmi** al fine di limitare il contatto tra olio e aria. **I locali** di stoccaggio devono essere **asciutti e privi di odori con temperature ottimali comprese tra i 12 e i 16 °C.** Dopo 15-20 giorni in caso di olio non filtrato **è necessario effettuare il primo travaso,** per eliminare la morchia naturalmente sedimentata, limitandone così il contatto con l'olio. Si consiglia di effettuare il travaso evitando di mettere in circolo il sedimento.

METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO

Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto scaricabili al link https://bit.ly/RLolivobio.
Indicazioni specifiche per la difesa sono contenute nei comunicati (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx),** emessi a livello provinciale sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali.
Il **comunicato BIO n. 6** di venerdì 2 ottobre è disponibile al link**:** https://tinyurl.com/y64vfndc

Il prossimo bollettino olivo sarà emesso giovedì 15 ottobre

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - **tel.** 0187.27871- **fax** 0187.278785
e-mail caarservizi@regione.liguria.it– **Web** www.agriligurianet.it, http://sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot