

BOLLETTINO OLIVO SAVONA—COMUNICATO N. 14 del 19 AGOSTO 2021




Nelle aree litoranee meglio esposte inizia il viraggio di colore delle olive da verde cupo a verde chiaro, giallastro. Si evidenzia la continuazione della cascola, con disseccamento delle drupe a partire dalla parte apicale. In oliveti particolarmente interessati dal fenomeno è importante valutare se la causa sia soltanto fisiologica, e quindi causata da siccità e stress idrici, o attribuibile anche a patologie fungine a carico dei frutti (<http://bit.ly/RL-olivo-patologie>) o comunque aggravata da queste ultime. In tal caso sarà necessario intervenire nella prossima primavera con i prodotti specifici consigliati nei bollettini.

La prima generazione estiva di mosca olearia è prossima al termine poiché nei campioni sono state osservate pupe e fori d'uscita. Nella maggior parte delle aree olivicole provinciali è dunque imminente l'inizio della seconda generazione, con conseguente ripresa delle ovideposizioni. L'ondata di caldo che ha caratterizzato la scorsa settimana ha causato alta mortalità a carico non solo delle giovani larve, ma anche di larve di terza età e pupe. Maggiori informazioni nell'ultimo bollettino agrometeo <https://tinyurl.com/y7kvfjht>.

La mortalità è risultata elevata (<https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Modellistica>), ma la diminuzione delle temperature massime registrata a partire da lunedì dovrebbe determinare una diminuzione dell'incidenza.

Nei campioni prelevati questa settimana nelle aree dove era stato consigliato di trattare il 29/7, sono state rilevate infestazioni attive contenute e non si consigliano quindi interventi con prodotti ad azione larvicida, sebbene nelle aree evidenziate in giallo questi sarebbero ammessi, poiché le infestazioni medie raggiungono la soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria (5-7%). **Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO** <https://bit.ly/RLmoscaolivo>.

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0-100 m Inf. Attiva (%)	100-200 m Inf. Attiva (%)	200-350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	ALLERTA (7%)	NON TRATTARE (2%)	—
	PONENTE	ALLERTA (7%)	ALLERTA (7%)	—
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (5%)	NON TRATTARE (5%)	TRATTATO 5/8
	PONENTE	ALLERTA (7%)	TRATTATO 5/8	TRATTATO 12/8
 FASCIA 3 ENTROTERRA	INTERA FASCIA	—	TRATTATO 5/8	

Per individuare la fascia del proprio oliveto è possibile consultare la guida al bollettino: <https://bit.ly/guida-sv>

SITUAZIONE IDRICA

Le riserve idriche si stanno esaurendo e nella maggior parte del territorio risultano necessari apporti. E' possibile consultare la situazione e gli apporti idrici consigliati, particolarmente necessari in caso di impianti recenti, al link <https://bit.ly/RLirrigazione>. Prima di irrigare è consigliabile verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/arpalmeteo>) e tenere conto che gli apporti irrigui possono favorire l'attività della mosca.

>> OLIVICOLTURA BIO: chi fosse interessato ad adottare metodi di lotta a basso impatto o biologici dovrà attuare le tecniche riportate nelle **Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto** (<https://bit.ly/RLolivobio>) e seguire le indicazioni dei comunicati specifici (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx**), emessi a livello provinciale senza una cadenza temporale predefinita, ma sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali.

A questo proposito si segnala che il 9 luglio è stato emesso il **comunicato BIO n. 2** (<https://tinyurl.com/mfe8yvku>) ed è imminente l'emissione del comunicato BIO n. 3.

>> ATTENZIONE AGLI INCENDI <<

Ricordando che in Liguria permane lo **STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI**, si invita a prestare la massima attenzione e visionare e diffondere il video realizzato dal Progetto MED PSS nell'ambito della campagna comune di comunicazione - <https://youtu.be/KT9uWoEHdo8>