

BOLLETTINO OLIVO SAVONA – COMUNICATO N. 9 del 14 LUGLIO 2022




Nella maggior parte degli oliveti di Fascia 1 e 2 l'indurimento del nocciolo è completo; lo sviluppo delle olive è rallentato a causa della siccità e delle elevate temperature e la dimensione delle drupe risulta eterogenea anche tra oliveti dello stesso areale, in funzione soprattutto della disponibilità idrica del suolo. Si osservano disseccamenti di olive e cascola.

Per ridurre l'evapotraspirazione delle foglie e proteggere la chioma dalle elevate temperature è possibile impiegare corroboranti con azione antiriscaldamento come le polveri di roccia (es: caolino), già consigliati peraltro come repellenti contro la mosca nelle strategie di difesa bio o a basso impatto. Sebbene le temperature continuino a essere sfavorevoli all'attività di ovideposizione della mosca e allo sviluppo larvale, nei campioni analizzati questa settimana sono state osservate ovideposizioni e rilevate infestazioni costituite in prevalenza da uova e in misura minore da larve di prima età. Le percentuali di infestazione attiva superano talvolta la soglia di intervento e sono fortemente correlate allo stato di idratazione e allo sviluppo delle olive, risultando pertanto anch'esse eterogenee, con situazioni talvolta molto differenti tra oliveti della stessa fascia e quota. **In particolare negli oliveti irrigui le infestazioni potrebbero essere superiori a quelle riportate in tabella** e pertanto si consiglia di verificare la situazione specifica del proprio oliveto, ad esempio determinando la percentuale di olive che hanno subito ovideposizione e stimando la mortalità nel proprio areale (<https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Modellistica>).

Come confermato anche dal **modello di stima della mortalità**, nei campioni analizzati è infatti stata osservata rilevante mortalità a carico delle giovani larve, la cui incidenza potrà essere meglio definita nei rilievi della prossima settimana, determinando la percentuale di larve che avrà raggiunto la seconda età. **In fascia 2 ponente alla quota 0-100m l'infestazione media supera la soglia di intervento** prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata Regionale (5-7%). Vista la mortalità rilevata e stimata, le condizioni meteo attuali e quelle previste per i prossimi giorni, **non si consiglia tuttavia di intervenire con prodotti ad azione larvicida**, poiché le attuali temperature possono contribuire al contenimento delle infestazioni. Si segnala quindi una situazione di allerta e si consiglia di prestare attenzione al prossimo comunicato. **Per maggiori dettagli su biologia e strategie di difesa, si rimanda alla scheda tecnica MOSCA DELL'OLIVO** <https://bit.ly/RLmoscaolivo>.

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE

ZONE		0-100 m Inf. Attiva (%)	100-200 m Inf. Attiva (%)	200-350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	NON TRATTARE (1%)	NON TRATTARE (0%)	—
	PONENTE	NON TRATTARE (3%)	NON TRATTARE (0%)	—
 FASCIA 2 – PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE (2%)	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (0%)
	PONENTE	ALLERTA (>10%)	NON TRATTARE (0%)	NON TRATTARE (0%)
 FASCIA 3 ENTROTERRA	INTERA FASCIA	NON TRATTARE (NON RILEVATO)		NON TRATTARE (NON RILEVATO)

La guida alla lettura dei bollettini e alla consultazione della tabella è disponibile al link: <https://bit.ly/guida-sv>


SITUAZIONE IDRICA

E' possibile consultare la situazione aggiornata e gli apporti idrici stimati al link <https://bit.ly/RLirrigazione>.

Prima di procedere con interventi irrigui è consigliabile verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/previsioniARPAL>), verificare eventuali limitazioni previste da ordinanze locali e tenere conto che gli apporti irrigui possono favorire l'attività della mosca.

METODO BIOLOGICO O A BASSO IMPATTO

>> OLIVICOLTURA BIO: chi fosse interessato ad adottare metodi di lotta a basso impatto o biologici dovrà attuare le tecniche riportate nelle **Linee guida per il controllo della mosca olearia in olivicoltura biologica o a basso impatto** (<https://bit.ly/RLolivobio>) e seguire le indicazioni dei comunicati specifici (**BOLLETTINO OLIVO BIO – Comunicato n. xx**), emessi a livello provinciale senza una cadenza temporale predefinita, ma sulla base delle necessità emerse dai rilievi settimanali. A questo proposito si segnala che il **29 giugno è stato emesso il comunicato BIO n. 1** (<https://tinyurl.com/2dz4abzx>) nel quale sono stati consigliati i primi interventi.



Servizi informativi accessibili tramite Telegram

Attraverso **CAARserviziBot** è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale informazioni sulla situazione idrica o previsioni del modello sull'avvio dell'infestazione estiva della mosca dell'olivo. Per attivarlo scaricare **Telegram** e ricercare **CAARserviziBot**, avviare e seguire il menu. Breve guida: <http://bit.ly/guidacaarservizibot>

>> Dichiarato lo STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI su tutto il territorio della Regione Liguria: è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto <https://tinyurl.com/RLincendi>