REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA

Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 14 del 11/6/2020 - GENOVA

PREVISIONI METEO—a cura di Arpal—www.arpal.gov

VENERDÌ 12 giugno		Deciso miglioramento e tempo prevalentemente soleggiato. Temperature in aumento.
SABATO 13 giugno		Peggioramento delle condizioni con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. T in calo.
DOMENICA 14 giugno		Piogge residue in mattinata e miglioramento nel pomeriggio. Temperature in aumento.
LUNEDÌ 15 giugno		Soleggiato. Temperature in aumento.
MARTEDÌ 16 giugno		Variabile. Temperature stazionarie.
MERCOLEDÌ 17 giugno		Aumento della nuvolosità. Temperature in calo.

FENOLOGIA—*rilievi del 8/6/2020*



http://bit.ly/BBCH_Vite2019

In costa i vigneti sono in fase di accrescimento degli acini, che hanno raggiunto mediamente la dimensione di un pisello (BBCH 75). In alcuni casi, come a Sestri Levante, la *Bianchetta*, anche per caratteristiche dl grappolo, è in fase di prechiusura.

Nell'entroterra tutti i vigneti monitorati sono tra la fine della fioritura e l'allegagione.

Bianchetta a Chiavari
(foto Dr. Agr. L. Calcagno)

GESTIONE VIGNETO

Viste le attuali condizioni meteo, con una buona disponibilità idrica e il probabile aumento delle temperature, si ricorda, soprattutto nelle zone costiere e di entroterra, l'importanza di effettuare tutte le operazioni finalizzate all'arieggiamento (sfemminellatura e sfogliatura della fascia produttiva) al fine di rendere tale zona meno umida e migliorare l'efficacia dei trattamenti, sia nei confronti dell'oidio che della botrite.

PIANO DI LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA - contributo volontario alla ricerca di ovature - maggiori informazioni su agriligurianet https://bit.ly/cimiceasiaticaliguria
I dettagli del piano nazionale sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale https://www.protezionedellepiante.it/news-home-1/

SITUAZIONE METEO



Le temperature massime sono state comprese tra i 22°C e i 25°C nella stazione di Lavagna e tra i 19°C e i 24°C in quella di Cogoleto. Le minime sono state comprese tra i 13 e i 18°C. Le piogge sono state intense, soprattutto nel ponente, dove il cumulato ha superato in alcune stazioni i 200 mm.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA - La settimana trascorsa è stata caratterizzata da una certa instabilità, con precipitazioni diffuse e molto consistenti in alcune zone. Le previsioni confermano ancora variabilità con precipitazioni sparse. Questo contesto richiede ancora di mantenere protetta la vegetazione.

Strategie di difesa:

In costa, nonostante le piante siano entrate in una fase meno sensibile al patogeno, le piogge cadute e quelle previste impongono ancora attenzione. Pertanto, una volta terminato il periodo di efficacia dal trattamento precedente (consigliabile attenersi a quello più breve in etichetta), in previsione di pioggia effettuare un trattamento con prodotti a base di rame anche in abbinamento a specifici come **zoxamide** o **fosfonati**.

Nelle aree di entroterra, appena possibile, eseguire un trattamento con principi attivi a maggiore persistenza (citotropici/affini alle cere). Tra questi si possono citare **amisulbrom**, **amectotradina** e **cyazofamid** e **zoxamide** (quest'ultimo con azione collaterale contro botrite) in miscela a principi di copertura come rame o in miscela con altri principi con diverso meccanismo d'azione (es. *Leimay, Enervin, Mildicut, Ampexio, Electis R, Zoxium).*

OIDIO: rispettando le tempistiche sopra descritte per i trattamenti antiperonosporici, abbinare al trattamento antiperonosporico zolfo ad alti dosaggi oppure, nelle zone più predisposte, prodotti specifici come **strobilurine** (es. *Flint, Quadris*) e **ciflufenamid** (es. *Cidely, Rebel top*), alternandoli con zolfo a dosi alte.

MUFFA GRIGIA (BOTRITE): persistono condizioni meteo favorevoli al fungo. Pertanto anche nell'entroterra, **solo per quei vitigni a grappolo serrato** in cui gli acini iniziano a toccarsi (soprattutto *Bianchetta*), effettuare, se non ancora eseguito, un trattamento preventivo con prodotti specifici. In zone predisposte ad attacchi, su vitigni meno sensibili potrebbero essere utilizzati prodotti naturali ammessi anche in biologico (per dettagli e prodotti http://bit.ly/botrite20).

Aziende Biologiche: ripristinare appena possibile la copertura rameica abbinando zolfo bagnabile. In aree a rischio oidio alternare, se possibile, zolfo in polvere prima della completa chiusura del grappolo o bicarbonato di potassio con azione anche su botrite.

Scheda tecnica Peronospora https://bit.ly/peronospora20
Peronospora copertura http://bit.ly/commperonosporacopertura2020
Peronospora citotropici http://bit.ly/commperonosporacitotr2020
Peronospora induttori http://bit.ly/commperonosporainduttori2020
Scheda tecnica Oidio - https://bit.ly/oidiovite2020
Prodotti Oidio https://bit.ly/commoidio2020
Scheda Botrite http://bit.ly/botrite20
Prodotti Botrite http://bit.ly/botrite20

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - **tel.** 0187.278770- **fax** 0187.278785
e-mail caarservizi@regione.liguria.it– **Web** www.agriligurianet.it, https://sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet @caarservizi Telegram: CAARserviziBot