BOLLETTINO VITE n° 15 del 18/6/2020 - GENOVA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov

VENERDÌ 19 giugno	Al mattino nuvolosità irregolare, poi ampi spazi soleggiati lungo la costa . Temperature stazionarie.
SABATO 20 giugno	Sereno o poco nuvoloso, addensamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio. Temperature in aumento.
DOMENICA 21 giugno	Sereno o poco nuvoloso, variabilità nell'interno. Temperature in aumento.
LUNEDÌ 22 giugno	Sereno o al più poco nuvoloso. Temperature in aumento.
MARTEDÌ 23 giugno	Sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie.
MERCOLEDÌ 24 giugno	Sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie.

SITUAZIONE METEO



Le temperature massime sono gradualmente salite attestandosi negli ultimi giorni tra i 23°C e i 25°C in costa e immediato entroterra. Le minime hanno oscillato tra i 14 e i 18°C. Le piogge, più frequenti a ponente, e spesso a carattere di rovescio, hanno apportato quantitativi variabili tra i 30 e i 50 mm.

FENOLOGIA – *rilievi del 15/6/2020*

http://bit.ly/BBCH_Vite2019



In costa i vigneti sono in fase di accrescimento degli acini, che hanno raggiunto mediamente la dimensione di un pisello nel *Vermentino* (BBCH 75); negli altri vitigni, in particolare quelli a grappolo compatto, gli acini ormai si toccano in particolare nella *Bianchetta*, che a Sestri è in fase di chiusura grappolo.

Nell'entroterra tutti i vigneti monitorati hanno iniziato l'allegagione e la dimensione degli acini è mediamente quella di un granello di pepe, con la *Bianchetta* nelle aree più calde che ha iniziato la fase di chiusura grappolo.

Bianchetta a Chiavari
(foto Dr. Agr. L. Calcagno)

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA - Strategie di difesa: in costa, nonostante le piante siano entrate in una fase meno sensibile al patogeno, è opportuno ancora proteggere la vegetazione in previsione di pioggia con prodotti a base di **rame** anche in abbinamento a specifici come **zoxamide** o **fosfonati**.

Nelle aree di entroterra, terminata l'efficacia del precedente intervento (attenendosi agli intervalli più brevi da etichetta) è consigliabile ripetere l'intervento. Nei vigneti più sensibili è ancora possibile utilizzare prodotti specifici come quelli consigliati nel precedente bollettino (es. *Leimay, Enervin, Mildicut, Ampexio, Electis R, Zoxium)*, oppure prodotti **rameici** abbinati a **fosfonati**. Tenere sempre in considerazione il numero massimo consentito per principio attivo al fine di non indurre fenomeni di resistenza. Maggiori dettagli sui principi attivi ammessi nelle schede tecniche nel box sotto.

OIDIO: abbinare al trattamento antiperonosporico zolfo ad alti dosaggi oppure, se non ancora utilizzati, nelle zone più predisposte, prodotti specifici come **strobilurine** (es. *Flint, Quadris*) e **ciflufenamid** (es. *Cidely, Rebel top*). Nelle aree di costa e in caso di grappoli prossimi alla chiusura potrebbe essere opportuno effettuare un trattamento con zolfo in polvere.

MUFFA GRIGIA (BOTRITE): persistono condizioni meteo favorevoli al fungo. Oltre alle operazioni citate in gestione del vigneto, nella fase di pre-chiusura – inizio chiusura grappolo, il trattamento preventivo risulta fondamentale, anche nella *Bianchetta* dell'entroterra. In questa fase si possono utilizzare prodotti specifici (es. *Switch, Cardinal 50, Teldor Plus, Prolectus, Brezza, Scala* e di recente introduzione *Kenja*) mentre in caso di minor rischio, ci sono una serie di prodotti naturali consentiti anche in agricoltura biologica (*es. Serenade, Botector, Polyversum, Amylo-X*).

Aziende Biologiche: ripristinare appena possibile la copertura rameica abbinando zolfo bagnabile. In aree a rischio oidio alternare, se possibile, zolfo in polvere prima della completa chiusura del grappolo o bicarbonato di potassio con azione anche su botrite.

GESTIONE VIGNETO

Viste le attuali condizioni meteo, con una buona disponibilità idrica e il probabile aumento delle temperature, si ricorda, soprattutto nelle zone costiere e di entroterra, l'importanza di effettuare tutte le operazioni finalizzate all'arieggiamento (sfemminellatura e sfogliatura della fascia produttiva) al fine di rendere tale zona meno umida e migliorare l'efficacia dei trattamenti, sia nei confronti dell'oidio che della botrite.

PIANO DI LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA - contributo volontario alla ricerca di ovature - maggiori informazioni su agriligurianet https://bit.ly/cimiceasiaticaliguria I dettagli del piano nazionale sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale https://www.protezionedellepiante.it/news-home-1/

Scheda tecnica Peronospora https://bit.ly/peronospora20
Peronospora copertura http://bit.ly/commperonosporacopertura2020
Peronospora citotropici http://bit.ly/commperonosporacitotr2020
Peronospora induttori http://bit.ly/commperonosporainduttori2020
Scheda tecnica Oidio - https://bit.ly/oidiovite2020
Prodotti Oidio https://bit.ly/commoidio2020
Scheda Botrite http://bit.ly/botrite20
Prodotti Botrite http://bit.ly/botrite20

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - **tel.** 0187.278770- **fax** 0187.278785
e-mail caarservizi@regione.liguria.it– **Web** www.agriligurianet.it, https://sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet @caarservizi Telegram: CAARserviziBot