


BOLLETTINO VITE n° 15 del 18/6/2020 - IMPERIA

PREVISIONI METEO –a cura di Arpal– www.arpal.gov

VENERDÌ 19 giugno		Al mattino nubi irregolari, poi soleggiato lungo costa, nubi e possibili temporali nell'interno. T stazionarie.
SABATO 20 giugno		Sereno o poco nuvoloso, addensamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio. Temperature in aumento.
DOMENICA 21 giugno		Sereno o poco nuvoloso, variabilità nell'interno. Temperature in aumento.
LUNEDÌ 22 giugno		Sereno o al più poco nuvoloso. Temperature in aumento.
MARTEDÌ 23 giugno		Sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie.
MERCOLEDÌ 24 giugno		Sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie.

SITUAZIONE METEO



Le temperature sono aumentate fino a valori massimi di 25-26°C in costa e 22-24°C all'interno. Le minime sono gradualmente salite, con valori negli ultimi giorni di 15-16°C in costa e lievemente minori nell'interno. Le piogge, più frequenti nell'interno, hanno apportato quantitativi variabili tra i 15-30 mm, fino a massimi di oltre 80 mm nelle zone più interne.

FENOLOGIA - rilievi del 15/6/2020

Zone costiere:

gli acini stanno ingrossando e hanno raggiunto mediamente le dimensioni di un pisello.

Zone Interne:

l'allegagione volge al termine e gli acini sono della dimensione di un grano di pepe


Zone Montane:

la fioritura volge al termine.

STADIO FENOLOGICO	
65 Piena fioritura	69 Fine fioritura
71 Allegagione	
73 Acini come un grano di pepe	
75 Acini come un pisello	

http://bit.ly/BBCV_Vite2019

VITIGNO	
■ ROSSESE DOLCEACQUA	
◆ ORMEASCO	
● VERMENTINO	
▲ PIGATO	



Rosse di Dolceacqua (sinistra) e a Ormeasco a Pornassio (Foto Agt. D. Passaniti)

GESTIONE VIGNETO

In queste condizioni, buona disponibilità idrica e il probabile aumento delle temperature, favorevoli allo sviluppo vegetativo, si ribadisce, soprattutto nelle zone costiere e di entroterra, l'importanza di effettuare tutte le operazioni finalizzate all'incremento dell'areeggiamento (sfemminellatura e sfogliatura) della fascia produttiva al fine di rendere tale zona meno umida e migliorare l'efficacia dei trattamenti.

PIANO DI LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA - contributo volontario alla ricerca di ovature - maggiori informazioni su agriligurianet <https://bit.ly/cimiceasiaticaliguria>

I dettagli del piano nazionale sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale <https://www.protezionedellepiante.it/news-home-1/>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA - Strategie di difesa:

Zone interne e montane: questo contesto meteo determina condizioni di rischio alto soprattutto in tali aree, pertanto si consiglia di mantenere protetta la vegetazione rinnovando la copertura con **rame** appena possibile. Per coloro che avessero usato prodotti specifici a più lunga persistenza, attenersi all'intervallo tra i trattamenti più breve riportato in etichetta (indicativamente 8-10 giorni) e ripetere il trattamento con i prodotti consigliati nel precedente bollettino es. *Mildicut, R6 Albis, Pergado R, Ampexio, Zorvec vinabel, Century, Tutor*, tenendo conto del numero massimo di trattamenti ammessi e cercando di alternare i principi attivi, associando comunque sempre un partner di copertura come il rame.

Nelle **aree costiere e di immediato entroterra**, considerata l'abbondante quantità di precipitazioni che si sono susseguite tra il mese di maggio e giugno, le piante in generale sono rigogliose e con vegetazione tenera, pertanto è consigliabile, allo scadere del periodo di efficacia del precedente trattamento e in previsione di pioggia, utilizzare **prodotti rameici** che contribuiscono ad ispessire gli organi vegetali aumentandone la resistenza.

OIDIO: la pressione del fungo rimane molto alta e per questo si raccomanda di aumentare il dosaggio dello **zolfo bagnabile** ed eventualmente abbinare o alternarlo a prodotti specifici come **strobilurine** e **ciflufenamid** (es. *Quadris, Flint, Cidely, Rebel top*) e di non prolungare gli intervalli tra un trattamento e il successivo. Dove possibile, anche in base alle previsioni meteo, intervallare con zolfo in polvere.

AZIENDE BIOLOGICHE: le piogge cadute, soprattutto se a carattere temporalesco e di rovescio, potrebbero aver dilavato la copertura. Si consiglia pertanto, appena possibile, di mantenere e rinnovare la copertura con **rame e zolfo**. In caso di infezioni oidiche in atto è possibile intervenire anche con olio essenziale di arancio (*Prevam plus*), che svolge anche azione bloccante, oppure anche con **bicarbonato di potassio**, con azione anche antibotritica.

Scheda tecnica Peronospora <https://bit.ly/peronospora20>

Peronospora copertura <http://bit.ly/commperonosporacopertura2020>

Peronospora citotropici <http://bit.ly/commperonosporacitotr2020>

Peronospora induttori <http://bit.ly/commperonosporainduttori2020>

Scheda tecnica Oidio - <https://bit.ly/oidio2020>

Prodotti Oidio <https://bit.ly/commoidio2020>

Scheda Botrite <http://bit.ly/botrite20>

Prodotti Botrite <http://bit.ly/botrite20>