


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 25 del 27/08/2020 - IMPERIA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov

VENERDÌ 28 Agosto		Nuvolosità tra irregolare e diffusa, possibili piovvaschi e schiarite nelle ore centrali. T massime in aumento.
SABATO 29 agosto		Marcata instabilità con fenomeni in intensificazione nel corso della giornata. Temperature in calo.
DOMENICA 30 agosto		Instabilità residua. Temperature stazionarie.
LUNEDÌ 31 agosto		Nuvolosità variabile, possibili fenomeni. Temperature in aumento.
MARTEDÌ 1 settembre		Nuvolosità variabile. Temperature in aumento.
MERCOLEDÌ 2 settembre		Nuovo peggioramento. Temperature stazionarie.

SITUAZIONE METEO



Le temperature non hanno subito particolari variazioni, più marcate nell'interno, mantenendosi, nei valori massimi intorno ai 30 °C in prossimità della costa e poco inferiori nell'entroterra. Le minime si sono mantenute sui 21 °C in prossimità della costa, lievemente più basse a ponente e nell'interno anche in virtù degli eventi piovosi, più significativi nell'entroterra di ponente.

MATURAZIONE UVE - (prelievo del 24.08.2020)

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI -°Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Diano Castello	<i>Vermentino</i>	18,6	20	10,5	11,4	6,2	7,7	3,35	3,24
Dolceacqua	<i>Pigato</i>	14,0	13,2	7,4	6,9	11,6	17,2	2,93	2,76
	<i>Rossese</i>	17,2	17,4	9,5	9,7	7,3	9,3	3,14	3,04
Pontedassio	<i>Pigato</i>	15,1	18,8	8,2	10,6	8,2	6,2	3,16	3,33
	<i>Vermentino</i>	14,3	19,2	7,6	10,9	8,3	6,9	3,03	3,19
Pornassio	<i>Ormeasco</i>	11,2	13,5	5,6	7,1	13,0	11,3	2,82	2,91
Ranzo	<i>Pigato</i>	13,5	16,5	7,1	9,1	9,7	10,0	2,99	2,99
Soldano loc. Pini	<i>Rossese</i>	18,0	20,3	10,1	11,6	6,5	6,3	3,26	3,23
Soldano fraz. Martino	<i>Rossese</i>	20,3	20,5	11,6	11,8	6,7	6,3	3,29	3,28
	MEDIA	15,8	17,7	8,6	9,9	8,6	9,0	3,11	3,11

In questa settimana, in media, il contenuto in zuccheri è aumentato di 2,1°Brix, mentre l'acidità è calata di quasi 3 g/l. A livello di aree, le zone a maturazione più avanzata sono quelle di costa per i bianchi (*Vermentino* a Diano con 18,6 °Brix) e Soldano per il *Rossese*, che in fraz. Martino ha raggiunto 20,3 °Brix. Nelle valli interne, invece, il contenuto medio in zuccheri si aggira intorno ai 14°Brix. Rispetto al 2019, in media non si rilevano differenze significative in merito all'acidità, mentre gli zuccheri sono inferiori di 1,9°Brix. Nell'ambito del confronto varietale le differenze più marcate sono nel *Vermentino* e *Pigato*, soprattutto a Pontedassio e a Ranzo, dove il tenore zuccherino medio è inferiore rispettivamente di 4,9, 3,7 e 3° Brix rispetto allo scorso anno ma in alcuni casi anche le acidità risultano inferiori (es. *Vermentino* a Diano e *Pigato* a Dolceacqua).

Si ricorda che la maturazione dipende comunque da molti fattori, e per valutare correttamente quella del proprio vigneto è possibile effettuare analisi delle uve pre-vendemmia. Il **Laboratorio Regionale di Sarzana (Pallodola)**, che fornisce un servizio specifico per valutare la maturazione delle uve (per maggiori informazioni: <https://tinyurl.com/RLanalisi>)



SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si conferma una eterogenea tenuta sanitaria del grappolo, in alcuni casi con inizio di spaccature e rammollimenti della buccia che se non controllati adeguatamente potranno generare marciumi.

Coloro che si trovano in queste situazioni dovranno pianificare le raccolte delle uve, diversificare la tipologia di destinazione del prodotto, mettere in atto opportune strategie fitosanitarie.

PERONOSPORA - La difesa è da considerarsi conclusa nelle aree costiere e interne, rimane tuttavia una condizione di attenzione nelle aree montane, dove le precipitazioni sono sempre presenti come è successo nei giorni 23 e 24 comportando una ripresa delle infezioni sulla nuova vegetazione. In tali aree è consigliabile rinnovare la copertura in fase di scadenza del trattamento come consigliato nei bollettini precedenti, allungare i tempi di copertura solo nel caso di assenza di precipitazioni e con vigneti che non presentano infezioni in atto.

OIDIO - Anche nelle zone montane l'invasiatura interessa la maggior parte degli acini e di conseguenza la pericolosità del fungo si riduce. In queste aree è possibile utilizzare zolfo a basso dosaggio o in alternativa prodotti a base di **Laminarina** (Vacciplant) e **Bacillus pumilis** (Sonata), oppure anche **AQ10** a base di **Ampelomyces quisqualis** che ha un effetto sul contenimento delle forme svernanti del fungo. Attenersi alle indicazioni d'uso in etichetta.

TIGNOLETTA - Le catture sono in flessione sia nell'estremo ponente che in Valle Arroscia. Attendere i prossimi rilievi, anche sulla base degli effetti del previsto cambi di condizioni meteo. **Scheda tecnica** <https://bit.ly/RL-tignoletta> e **prodotti ammessi** <https://bit.ly/commtignoletta2020>

BOTRITE - Tenuto conto delle possibili piogge, coloro che si trovano in situazioni sanitarie a rischio marciumi dei grappoli, previa una accurata sfogliatura della zona produttiva, dovranno intervenire tempestivamente, soprattutto in caso di pioggia, con prodotti antibotritici, preferendo quelli con minor tempo di carenza. **Prodotti commerciali antibotritici ammessi:** <https://bit.ly/commbotrite2020> **Scheda tecnica BOTRITE:** <http://bit.ly/botrite20>