REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA

Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 10 del 14/5/2020 - LA SPEZIA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov

VENERDÌ 15 maggio		Piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, schiarite dalla serata. Temperature in calo.
SABATO 16 maggio		Nuvolosità irregolare con piogge diffuse dal pomeriggio. Temperature massime in calo.
DOMENICA 17 maggio		Miglioramento e ritorno del sole. Temperature in aumento.
LUNEDÌ 18 maggio		Poco o irregolarmente nuvoloso. Temperature in aumento.
MARTEDÌ 19 maggio		Nubi in aumento e deboli piogge. Temperature in calo.
MERCOLEDÌ 20 maggio		Piogge in esaurimento e schiarite. Temperature stazionarie.

SITUAZIONE METEO



Le temperature, dopo un calo a causa delle piogge, hanno subito un rialzo, toccando massime di 24-25 °C. Le minime si sono mantenute pressoché stabili, sui 14-15 °C in costa, lievemente inferiori nell'entroterra. Le piogge sono state significative soprattutto l'11 maggio apportando nel complesso tra i 30 e i 40 mm.

FENOLOGIA

Le condizioni meteo hanno continuato a favorire lo sviluppo vegetativo e la differenziazione dei grappoli fiorali. In costa e nei versanti caldi collinari i principali vitigni rossi (Merlot e Sangiovese) hanno grappoli fiorali con i singoli bottoni separati (BBCH 57) e sono prossimi alla fioritura. Negli areali costieri, alle quote basse, si vedono già i primi fiori aperti, anche sui vitigni bianchi, in particolare sui precoci (Bosco). Il Vermentino in Val di Magra appare mediamente un po' più indietro, ma nei vigneti a fenologia più avanzata mostra infiorescenze pienamente sviluppate e bottoni fiorali in fase di separazione. Nelle aree più interne, si nota un notevole progresso, con grappoli ben distesi e differenziati su gran parte dei vitigni (BBCH 55-57).



http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Foto CAAR - *Vermentino* a S. Stefano Magra

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA: l'attuale contesto meteo, con le piogge cadute in settimana e quelle previste nei prossimi giorni di instabilità, incrementano il potenziale rischio di infezioni, tanto che sono aumentati i sintomi rilevati sul territorio.

Strategie di difesa: non appena le condizioni meteo lo consentono, terminate le piogge e possibilmente in assenza di vento, si consiglia di ripristinare la protezione sulla vegetazione, soprattutto nelle zone più predisposte e ormai prossime alla fioritura. Considerate le piogge e la crescita della vegetazione, si consiglia, di attenersi al periodo più stretto di efficacia riportato per i prodotti utilizzati.

In questo periodo è opportuno utilizzare principi attivi a lunga persistenza d'azione (citotropici/translaminari come ***dimetomorf, mandipropamide, cyazofamid, benthiavalicarb, oxathiapiprolin, iprovalicarb*** ecc. es *Mildicut*, *Vintage C*, *Quasar*, *Pergado*, *Zorvec zelavin*, *Melody*) facendo attenzione al numero massimo di trattamenti ammessi. In alternativa, nelle zone con vegetazione più sviluppata e ormai prossima alla fioritura utilizzare principi attivi ad azione sistemica (es. **metalaxil-m**) o **benalaxyl-m** in abbinamento a principi attivi di copertura come **rame** (es. *Actlet C, Tango R o Ridomil gold, Saviran, Fantic*). Nel caso di vigneti soggetti a marciumi o black rot ed escoriosi, si possono impiegare anche miscele con **folpet** che garantiscono un'azione collaterale anche per tali patologie.

OIDIO: anche se al momento le condizioni meteo potrebbero aver sfavorito il patogeno, stiamo entrando in una fase molto sensibile. Si consiglia pertanto di abbinare **zolfo bagnabile/liquido** a dosaggi pieni al trattamento antiperonosporico, e nelle aree più predisposte, come le zone collinari prossime al mare, con vegetazione molto sviluppata, utilizzare prodotti ad azione sistemica come gli **IBE** (es. *Scudex, Topas, Radar Combi, Domark, Concorde*) associati a zolfo.

Aziende Biologiche: mantenere la copertura con **rame e zolfo** (liquido o bagnabile) in previsione di pioggia.

In caso di aree più soggette ad oidio, è possibile alternare trattamenti con zolfo in polvere.

Scheda tecnica Peronospora https://bit.ly/peronospora20
Scheda tecnica Oidio - https://bit.ly/oidiovite2020
Prodotti commerciali ammessi Oidio https://bit.ly/commoidio2020
Peronospora https://bit.ly/commperonosporasistemici2020
http://bit.ly/commperonosporacopertura2020
http://bit.ly/commperonosporacitotr2020
http://bit.ly/commperonosporainduttori2020

GESTIONE VIGNETO

Anche nelle zone di entroterra e interne, è possibile iniziare il diradamento dei germogli in sovrannumero, doppi, sterili o fuoriusciti dal legno vecchio (*polloni*).

Queste operazioni permettono di riequilibrare la pianta, migliorare l'efficacia dei trattamenti fitosanitari e rendere ben esposti i grappolini fiorali.

PROROGA ABILITAZIONI ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, CONSULENTI E ATTESTAZIONI PER MACCHINE IRRORATRICI - Con la recente conversione in legge del D.L. 18/2020 è stato modificato l'art. 103, comma 2 che regolava tra l'altro la scadenza delle abilitazioni/attestazioni sopra indicate. Con il nuovo testo legislativo le abilitazioni/attestazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi al 31 luglio 2020

MISURE REGIONALI COMPARTO AGRICOLO, FORESTALE, PESCA, ENTI LOCALI e CITTADINI: https://bit.ly/RLagricovid

ORDINANZE e DECRETI su Covid19: https://bit.ly/RLodcovid

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - **tel,** 0187.278770- **fax** 0187.278785
e-mail caarservizi@regione.liguria.it– **Web** www.agriligurianet.it, https://sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet @caarservizi Telegram: CAARserviziBot