


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 11 del 21/5/2020 - LA SPEZIA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov

VENERDÌ 22 maggio		Velature al mattino, addensamenti di tipo cumuliforme sui rilievi nel pomeriggio-serata. T. in calo.
SABATO 23 maggio		Sereno, nel pomeriggio aumento delle nubi con brevi rovesci possibili in serata sui rilievi. T max in calo.
DOMENICA 24 maggio		Variabilità con residui piovvaschi. Temperature in aumento.
LUNEDÌ 25 maggio		In prevalenza soleggiato. Temperature stazionarie.
MARTEDÌ 26 maggio		Poco nuvoloso. Temperature in calo.
MERCOLEDÌ 27 maggio		Poco nuvoloso. Temperature in calo.


SITUAZIONE METEO



Le temperature, seppur con qualche calo in corrispondenza delle piogge, hanno subito un rialzo, toccando massime oltre i 27 °C. Anche le minime sono salite, raggiungendo valori sui 18 °C in costa, lievemente inferiori nell'entroterra. Le piogge sono state frequenti, spesso associate a brevi rovesci, ma non molto significative se non il 19/5.

FENOLOGIA-rilievi del 18/5

Lungo la costa i principali vitigni rossi (*Merlot* e *Sangiovese*) e bianchi precoci (*Bosco*), sono prossimi o già nel pieno della fioritura e, in alcune piante, a Riomaggiore mostrano già parte dei fiori allegati. In **Val di Magra** tutte le varietà a bacca rossa hanno iniziato la fioritura: il *Sangiovese* è nel pieno di questa fase (BBCH 65), *Merlot* e *Cabernet* l'hanno appena iniziata (BBCH 61) Il *Vermentino* si trova prevalentemente nella fase di prefioritura (BBCH 57) e solo nei vigneti a fenologia più avanzata si possono osservare i primi grappoli fioriti, mentre in altri i bottoni fiorali sono ancora in fase di distanziamento (BBCH 55) ma con bottoni fiorali in alcuni casi già ben sviluppati. Nelle **aree più interne** si nota altresì un notevole progresso con avanzata differenziazione dei grappoli, soprattutto nei vitigni rossi, che sono prossimi all'inizio della fioritura.



http://bit.ly/BBCH_Vite2019



Foto CAAR - Bosco a Riomaggiore

GESTIONE VIGNETO

Nelle aree a maggior sviluppo della vegetazione è possibile anche eseguire delle sfemminellature qualora queste siano posizionate in modo da creare affastellamenti soprattutto in zona grappolo.

PROROGA ABILITAZIONI ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, CONSULENTI E ATTESTAZIONI PER MACCHINE IRRORATRICI - Con la recente conversione in legge del D.L. 18/2020 è stato modificato l'art. 103, comma 2 che regolava tra l'altro la scadenza delle abilitazioni/attestazioni sopra indicate. Con il nuovo testo legislativo le abilitazioni/attestazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi al 31 luglio 2020.

MISURE REGIONALI COMPARTO AGRICOLO, FORESTALE, PESCA, ENTI LOCALI e CITTADINI: <https://bit.ly/RLagricovid>

ORDINANZE e DECRETI su Covid19: <https://bit.ly/RLodcovid>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA: il periodo è stato favorevole al patogeno, con diversi eventi piovosi (anche se brevi) e, considerando la marcata sensibilità delle piante in fioritura, è opportuno mantenere alta l'attenzione.

Strategie di difesa: coloro che hanno eseguito i trattamenti consigliati, utilizzando prodotti di lunga persistenza, dovranno aspettare la fine del periodo di efficacia (10-12 giorni). Pertanto, nelle aree a fenologia più avanzata e con piante già in fioritura, tale intervento potrebbe essere sufficiente a mantenere protetta la vegetazione fino a fine fioritura. Diversamente, in caso di vigneto in fioritura e periodo di efficacia terminato, è opportuno attendere la fine della fioritura e intervenire con prodotti citotropici/translaminari o principi attivi ad azione sistemica come consigliato nel precedente bollettino. A fine fioritura potrebbe essere opportuno utilizzare **zoxamide** che ha anche un'azione collaterale contro botrite (esistono miscele con prodotti citotropici o di copertura es. *Presidium one*, *Electis R*, *Zorvec vinabel*, ecc.). Conviene invece attendere lo sviluppo degli acini per utilizzare principi a maggiore affinità con le cere.

Attenersi sempre al numero massimo di interventi ammesso per principio attivo, da etichetta o da disciplinare di produzione integrata regionale (<http://bit.ly/RL20ddc-vite>).

OIDIO: si sta entrando in una fase molto sensibile per cui, tenendo conto delle indicazioni sui tempi dei trattamenti antiperonosporici, è possibile utilizzare prodotti ad azione sistemica come gli **IBE** (es. *Scudex*, *Topas*, *Radar Combi*, *Domark*, *Concorde*) associati a zolfo a dosaggi medi o principi come **proquinazid** e **flutriafol** (es. *Talendo* e *Impact*).

Aziende Biologiche: eseguire interventi prima della piena fioritura, abbinando prodotti che permettono di ridurre le dosi di rame, come ad esempio **Cerevisanae** (*Romeo*). Per oidio è possibile utilizzare *Ibisco*, anche in associazione a zolfo, o **bicarbonato di potassio**.

Scheda tecnica Peronospora <https://bit.ly/peronospora20>

Scheda tecnica Oidio - <https://bit.ly/oidio2020>

Prodotti commerciali ammessi Oidio <https://bit.ly/commoidio2020>

Peronospora sistemici <https://bit.ly/commperonosporasistemic2020>

Peronospora copertura <http://bit.ly/commperonosporacopertura2020>

Peronospora citotropici <http://bit.ly/commperonosporacitotr2020>

Peronospora induttori <http://bit.ly/commperonosporainduttori2020>