


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 8 del 30/4/2020 - SAVONA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov		
VENERDÌ 1 maggio		Soleggiato con velature a tratti estese, instabilità pomeridiana sui rilievi. Temperature in aumento.
SABATO 2 maggio		Condizioni più stabili con ampie schiarite alternate a passaggi di nubi medio-alte. T max in aumento.
DOMENICA 3 maggio		Soleggiato con velature. Temperature in aumento.
LUNEDÌ 4 maggio		Soleggiato. Temperature stazionarie.
MARTEDÌ 5 maggio		Nubi irregolari. Temperature stazionarie.
MERCOLEDÌ 6 maggio		Variabilità. Temperature in calo.




Le temperature, dopo un progressivo calo, e dopo le piogge, hanno subito un rialzo attestandosi negli ultimi giorni su massime di 20°C sia in costa che nel primo entroterra. Le minime, dopo un rialzo, sono scese sui 12°C. Le piogge sono state significative, apportando mediamente quantitativi tra i 30 e i 40 mm, fino a valori superiori in alcune zone del levante provinciale.

FENOLOGIA - rilievi del 27/4/2020

Zone costiere: si nota l'emissione dell'infiorescenza sui singoli germogli

Zone Interne: i germogli in genere superano le 5 e 6 foglie e si intravedono le infiorescenze.



http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Foto Agt. Diego Passaniti:
Granaccia a Quiliano



SITUAZIONE IDRICA

Gli apporti di questa settimana hanno soddisfatto le esigenze delle piante ristabilendo nelle zone a maggior piovosità una situazione di buon contenuto idrico dei terreni. Per questo non si rendono necessari interventi irrigui neanche nel caso di giovani impianti.

NOTA FITOSANITARIA VITIGNO GRANACCIA - Particolare attenzione dovrà essere rivolta a questo vitigno. Infatti la caratteristica presenza di internodi più ravvicinati rispetto ad altri vitigni comporta un maggiore affastellamento fogliare nella fascia produttiva. Inoltre il vitigno è sensibile alla carenza di calcio, pertanto è opportuno effettuare delle concimazioni con tale elemento anche per via fogliare. In considerazione di ciò si raccomanda di eseguire operazioni di sfogliatura in fase pre-fiorale e in condizioni meteo avverse, piogge frequenti e/o bagnature fogliari continue, e può essere opportuno trattare in piena fioritura con antibottrici a base terpenica (**3Logy**)

Misure per il comparto agricolo, forestale e della pesca, Enti locali e cittadini - <https://bit.ly/misureemergenzacovid19>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA - Le piogge cadute in settimana si configurano, per l'entità, come quelle che potrebbero dare inizio all'infezione primaria in gran parte delle aree viticole provinciali, tenendo conto anche delle prolungate bagnature fogliari e che la vegetazione è pienamente recettiva e sta entrando in una fase più sensibile al patogeno. Pertanto è necessario prestare attenzione per le zone costiere e interne e considerare che le previsioni a medio termine confermano un andamento meteo rivolto al bel tempo. In tale contesto, laddove siano stati eseguiti trattamenti con **prodotti di copertura/contatto** è opportuno rinnovare la protezione, mentre per coloro che hanno utilizzato prodotti translaminari/sistemici consigliati nel precedente bollettino (**fosfonati** o **fosetyl-Al** es. *Optix R*, *Erresei Bordeaux*, *Tutor*), è necessario ripetere l'intervento al termine del periodo di efficacia.

ESCORIOSI - Le piogge potrebbero aver favorito un'iniziale diffusione del fungo sulla nuova vegetazione. Siccome le aree predisposte a tale patologia sono spesso soggette a peronospora, si ricorda che è possibile utilizzare in questa fase prodotti a duplice azione come i ditiocarbammati (es. **metiram**).

OIDIO - Nonostante le piogge un po' più intense possano aver sfavorito il patogeno, considerato l'andamento climatico di questi ultimi anni si consiglia di mantenere alta l'attenzione e controllare periodicamente il proprio vigneto al fine di rilevare eventuali macchie sulle foglie.

Per questo motivo è opportuno **abbinare al trattamento antiperonosporico** sempre un prodotto antioidico, in questo momento **zolfo bagnabile oppure liquido**, rimandando l'uso di prodotti sistemici o specifici in pre-fioritura.

AZIENDE BIOLOGICHE - Coloro che attuano la difesa con metodo biologico devono mantenere la copertura a seguito delle piogge cadute, con **rame e zolfo** (liquido o bagnabile). Considerato il periodo si consigliano formulati con buona prontezza di azione come idrossido di rame o solfato tribasico. Esistono anche prodotti corroboranti o prodotti che inducono l'attivazione delle difese delle piante (es. *Cerevisanae - Romeo*) che possono essere abbinati a rame e nel contempo ne riducono le dosi. Per maggiori dettagli è possibile consultare le schede tecniche nel box sottostante:

Scheda tecnica Peronospora - <https://bit.ly/peronospora20>

Scheda tecnica Oidio - <https://bit.ly/oidio2020> e prodotti commerciali ammessi <https://bit.ly/commoidio2020>