


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 24 del 20/08/2020 - SAVONA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov

VENERDÌ 21 agosto		Sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento.
SABATO 22 agosto		Sereno, isolati annuvolamenti cumuliformi diurni sui rilievi; umidità in aumento. Temperature stazionarie.
DOMENICA 23 agosto		Nubi irregolari, possibili temporali in serata. Temperature stazionarie.
LUNEDÌ 24 agosto		Instabile, possibili rovesci. Temperature in calo.
MARTEDÌ 25 agosto		Ritorna l'alta pressione, sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo.
MERCOLEDÌ 26 agosto		Soleggiato, nubi in aumento in serata. Temperature stazionarie.

SITUAZIONE METEO




Le temperature massime sono calate rispetto alla settimana precedente, attestandosi intorno ai 30 °C. Le minime si sono mantenute intorno ai 21 °C in costa e poco meno nell'entroterra. Le piogge hanno interessato soprattutto il levante provinciale, con cumulati di oltre 30 mm.

MATURAZIONE UVE - (prelievo del 17.08.2020)

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI - °Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Albenga	<i>Pigato</i>	12,4	13,8	6,4	7,3	11,7	10,9	2,98	2,93
	<i>Rossese</i>	13,2	12,9	6,9	6,7	10,3	11,7	3,06	2,94
	<i>Vermentino</i>	14,8	15,6	8,0	8,5	9,8	9,8	3,08	2,98
Finale Ligure	<i>Barbarossa</i>	11,5	14,3	5,8	7,6	13,4	15,1	3,00	2,78
	<i>Granaccia</i>	14,6	12,1	7,8	6,2	10,3	16,1	2,98	2,82
	<i>Vermentino</i>	12,4	14,2	6,4	7,6	12,2	13,6	3,01	2,85
Noli	<i>Lumassina</i>	6,5	8,4	ND	ND	28,4	31,6	2,78	2,7
Ortovero	<i>Pigato</i>	13,2	16,0	6,9	8,7	9,8	9,7	2,96	2,96
Quiliano	<i>Granaccia</i>	13,2	13,5	6,9	7,1	10,8	14,0	3,03	2,88
	<i>Lumassina</i>	10,7	6,5	5,3	ND	22,9	34,8	2,84	2,74
	MEDIA	12,3	12,7	6,7	7,5	14,0	16,7	3,00	2,9

In queste due settimane la maturazione delle uve è progredita: il contenuto in zuccheri è aumentato in media di 4,9°Brix e, ancora con maggiore evidenza, si è rilevato il calo delle acidità (mediamente di 12,4 g/l). A livello di aree, le zone a maturazione più avanzata sono quelle di costa, dove il contenuto medio in zuccheri è di 13,2°Brix; nelle valli interne, invece, il contenuto medio in zuccheri si aggira intorno ai 10,9°Brix.

Rispetto all'anno precedente, confrontando le medie per singoli vitigni, si notano alcune differenze per gli zuccheri, che risultano superiori di circa 1°Brix per *Lumassina* e *Granaccia* e inferiori per *Pigato*, *Vermentino* e *Barbarossa*, rispettivamente di 2,1, 1,3 e 2,8°Brix; il *Rossese*, infine, non presenta differenze significative rispetto all'anno scorso. Quanto all'acidità, mediamente inferiore di 2,8 g/l rispetto al 2019, le differenze più evidenti si riscontrano in *Lumassina* (-7,57 g/l) e in *Granaccia* (-4,52 g/l).



SITUAZIONE FITOSANITARIA

Lo stato sanitario del grappolo è molto eterogeneo perché è stato condizionato da diversi fattori: piogge frequenti nel periodo di post allegazione hanno favorito lo sviluppo di peronospora larvata, eventi grandinigeni sparsi sul territorio hanno causato ferite che in diversi casi a causa delle condizioni meteo (piogge e rugiade) sono progredite in marciumi. Coloro che si trovano in queste situazioni dovranno pianificare la raccolta delle uve, diversificare la tipologia di destinazione del prodotto, mettere in atto strategie fitosanitarie adeguate e accurata sfogliatura.

PERONOSPORA - Nelle aree più interne, dove sono possibili precipitazioni o bagnature fogliari notturne è consigliabile rinnovare la copertura una volta terminata l'efficacia dell'ultimo trattamento e allungare i tempi solo in assenza di piogge e con vigneti che non presentano infezioni in atto.

OIDIO - solo nelle aree più interne è possibile continuare la difesa con zolfo bagnabile a basso dosaggio, e alternando eventualmente a prodotti a base di bicarbonato di potassio (es. *Armicarb*, *Karma*).

TIGNOLETTA - si conferma una tendenza al rialzo del numero di catture solo in bassa valle Arroscia, nel comune di Ortovero; coloro che non avessero ancora trattato potranno farlo entro la settimana usando **emamectina** (es. *Affirm*), **Bacillus thuringiensis** (es. *Dipel*, *Turex*, *Kristal*, *Florbac*), o **spinetoram** (es. *Radiant pro*, *Fidelity*). Nelle altre aree le catture sono in flessione. Maggiori informazioni su tignoletta nella **scheda tecnica** <https://bit.ly/RL-tignoletta> e prodotti ammessi <https://bit.ly/commtignoletta2020>

BOTRITE - nei vigneti colpiti da grandine e soggetti a marciumi, oltre a sfogliature in zona grappolo, effettuare interventi con prodotti a breve intervallo di sicurezza come quelli di origine naturale e ammessi anche in biologico.

Prodotti commerciali antibotritici ammessi: <https://bit.ly/commbotrite2020> **Scheda tecnica BOTRITE:** <http://bit.ly/botrite20>