


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 17 del 01/07/2021 - SAVONA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov		
VENERDÌ 2 luglio		Sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature in aumento.
SABATO 3 luglio		Sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature in aumento.
DOMENICA 4 luglio		Possibile instabilità associata a piogge sparse. Temperature in calo.
LUNEDÌ 5 luglio		Condizioni in miglioramento con nuvolosità residua. Temperature stazionarie.
MARTEDÌ 6 luglio		Generali condizioni di bel tempo. Temperature in aumento.
MERCOLEDÌ 7 luglio		Soleggiato con possibili addensamenti all'interno. Temperature in aumento.



Le temperature, dopo un primo periodo di stabilità, hanno poi registrato un deciso aumento fino a raggiungere e superare i 33°C e tornare successivamente ai valori di inizio periodo. Minime invece costanti nell'intervallo tra i 17 e 21°C lungo tutta la settimana. Le precipitazioni sono state praticamente assenti.

FENOLOGIA - rilievi del 28/6

Zone costiere: la fase prevalente anche questa settimana è la BBCH 75 (acino delle dimensioni di un pisello).

Zone Interne: gli acini hanno raggiunto le dimensioni di un pisello (BBCH 75).




Foto: Agt. D. Passaniti - Lumassina a Noli a sx e Barbaresco a Finale a dx

Nuovo strumento di modellistica (fenologia della vite e altri indicatori utili) al link <https://tinyurl.com/CAARmodelli>
La scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite2019

IN CAMPO

IRRIGAZIONE: nell'attuale fase fenologica la disponibilità idrica è importante per evitare perdite quanti-qualitative della futura produzione o nel caso di giovani impianti. L'assenza di precipitazioni e le elevate temperature stanno favorendo l'esaurimento delle risorse idriche del suolo ed i modelli di stima dei fabbisogni evidenziano la necessità di intervento in ogni tipo di terreno e in tutte le zone viticole provinciali, sebbene in modo diversificato. .

Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA:
<https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione>

GESTIONE INFESTANTI: contenere la crescita del cotico erboso, anche del sottofila, sia per limitare la competizione idrica che per la preparazione in vista del secondo trattamento obbligatorio per la flavescenza dorata.



Tramite l'applicazione **Telegram**, cercando **CAARserviziBot** è possibile accedere ai **bollettini** e a molte altre informazioni specifiche (es. schede tecniche, prodotti commerciali, disciplinari). Una guida è disponibile al link <http://bit.ly/guidacaarserviziobot>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA: le alte temperature del periodo e lo stadio fenologico attuale non predispongono alle infezioni da parte del patogeno, soprattutto in **costa** e nelle **zone interne**. Al momento non si consigliano trattamenti specifici, se non eventualmente l'impiego di rame in previsione di piogge. Nelle zone interne o di fondovalle che hanno in precedenza sviluppato infezioni è possibile abbinare il rame a **fosfiti** o in alternativa a **mandipropamide** e **zooxamide** (es. Pergado SC, Ampexio).

OIDIO: il rischio resta alto e confermato anche da modelli previsionali. Sono state rilevate alcune infezioni lungo la costa e nelle zone interne con sviluppo su lamina fogliare, che occasionalmente interessano anche il grappolo. Tali situazioni si riscontrano soprattutto nei vigneti in ritardo con le operazioni di potatura verde necessarie per allungare la fascia produttiva. In post-allegagione è consigliabile, ove possibile, utilizzare **zolfo in polvere** su vegetazione asciutta e nelle ore più fresche della giornata, alternando prodotti sistemici (laddove le piante non hanno ancora i grappoli completamente sviluppati) o specifici associati a zolfo bagnabile. In alternativa allo zolfo è possibile utilizzare **bicarbonato di potassio** (es. Armicarb 85, Karma 85) che ha anche un effetto antibotritico.

BOTRITE: le condizioni climatiche al momento non sono favorevoli al patogeno. Le buone pratiche di potatura verde eseguite nella fascia produttiva come la sfemminellatura e sfogliatura, assieme all'utilizzo di prodotti rameici per la difesa, sono misure generalmente sufficienti a ridurre il rischio in questa fase. Solo in caso di vigneti sensibili e in aree predisposte ad attacchi, prima della chiusura del grappolo è possibile eseguire un trattamento preventivo, utilizzando prodotti specifici previsti dal disciplinare e come indicato nella scheda tecnica: <https://tinyurl.com/botrite>

TIGNOLETTA: le catture sono risultate basse su tutto il territorio; in considerazione delle attuali condizioni climatiche non si consigliano comunque trattamenti. Maggiori dettagli nella scheda recentemente revisionata <https://bit.ly/RL-tignoletta>

AZIENDE BIOLOGICHE: il rischio di sviluppo di peronospora rimane basso e, in assenza di piogge e bagnature notturne, non sono opportuni trattamenti, fatta eccezione per le zone interne o di fondovalle che hanno in precedenza sviluppato infezioni. Nelle zone sensibili a oidio è possibile utilizzare **zolfo** a dosaggi medi (2 kg di zolfo/ha) anche in associazione con l'**olio essenziale di arancio dolce** (Prev-Am Plus). Come già anticipato, in alternativa allo zolfo è possibile utilizzare il **bicarbonato di potassio**.