


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 22 del 5/08/2021 - SAVONA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov

VENERDÌ 6 agosto		Nubi irregolari con possibili rovesci. T minime in aumento.
SABATO 7 agosto		Variabile, con schiarite alternate a passaggi di nubi. Temperature in aumento.
DOMENICA 8 agosto		Variabile, con schiarite alternate a passaggi di nubi. Temperature in aumento.
LUNEDÌ 9 agosto		Soleggiato. Temperature stazionarie.
MARTEDÌ 10 agosto		Soleggiato. Temperature stazionarie.
MERCOLEDÌ 11 agosto		Soleggiato. Temperature in aumento.

SITUAZIONE METEO



Le temperature, da metà settimana in poi, hanno subito un costante calo che le ha portate da una media di 29°C fino a 25°C. Le minime hanno registrato un calo in concomitanza con l'evento precipitativo del 1/8, attestandosi poi intorno ai 20°C. Le precipitazioni già citate hanno portato a cumulati che hanno raggiunto un massimo di circa 10 mm nell'areale di Pietra Ligure.

MATURAZIONE UVE (prelievi del 2/8/21)

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI - °Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Albenga	Pigato	8,1	8,2	ND	ND	27,25	24,77	2,59	2,69
	Rossese	6,4	7,8	ND	ND	32,52	26,33	2,55	2,63
	Vermentino	10,4	11,4	5,1	5,8	22,38	16,48	2,63	2,80
Finale Ligure	Barbarossa	6,0	6,7	ND	ND	35,04	28,40	2,46	2,62
	Granaccia	8,0	6,2	ND	ND	29,52	25,26	2,62	2,63
	Vermentino	6,6	8,8	ND	ND	33,79	23,85	2,49	2,62
Noli	Lumassina	4,3	4,7	ND	ND	35,57	33,69	2,56	2,63
Ortovero	Pigato	8,1	8,9	ND	ND	30,07	22,67	2,56	2,64
Quiliano	Granaccia	6,0	6,1	ND	ND	30,40	25,22	2,60	2,74
	Lumassina	4,3	4,7	ND	ND	37,00	37,05	2,60	2,66

Come ogni anno, durante la prima settimana di agosto sono stati effettuati campionamenti di uve dai vigneti della rete di monitoraggio in modo da avere un riferimento analitico all'inizio della maturazione. I dati riportati in tabella relativi ai prelievi di uve effettuati il 2 agosto evidenziano una situazione di leggero ritardo rispetto all'anno precedente. Confrontando la media di tutti i campioni analizzati, rispetto all'anno scorso le differenze sono modeste: in media si riscontra un accumulo zuccherino inferiore di 0,53°Brix rispetto al 2020, mentre i valori di acidità medi sono superiori di circa 5 g/l (31,3 nel 2021 e 26,3 g/l nel 2020). Maggiori dettagli sul confronto con le ultime annate saranno disponibili nel prossimo bollettino e valutazioni più accurate sull'andamento della maturazione potranno essere fatte a partire dai dati del prossimo prelievo che avverrà lunedì 16 agosto.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA - Non si rilevano criticità in tutto il territorio provinciale.

Anche per le **aree interne** la difesa è da ritenersi conclusa, permane tuttavia un'attenzione rivolta ai vigneti posti alle quote altimetriche più alte oppure nei fondovalle. In questo caso eventuali rovesci temporaleschi potrebbero far ripartire le infezioni a carico dei germogli (femminelle) pertanto è consigliabile verificare sempre le previsioni meteo e intervenire se necessario con prodotti rameici.

OIDIO - Nei vigneti posti in zona costiera la difesa è da ritenersi conclusa; nelle zone interne si possono allungare i tempi tra un trattamento e il successivo, utilizzare zolfo a basso dosaggio oppure formulati alternativi a base di **olio essenziale di arancio dolce** (Prev-Am plus), **bicarbonato di potassio** oppure, nel caso di vigneti esenti da infezioni, **Bacillus pumilis** (es. Sonata) e **Bacillus amyloliquefaciens** (es. Taegro).

TIGNOLETTA - Il volo della 3° generazione è iniziato alle quote più basse lungo la fascia costiera. Al momento non si consigliano interventi.

DROSOPHILA—(*Drosophila suzukii*) in particolare su vitigni sensibili a con acini a buccia sottile come il Rossese questo insetto di recente introduzione può arrecare danni. Per maggiori informazioni su *Drosophila suzukii* consultare la scheda al link <http://bit.ly/Dsuzukii>

AZIENDE BIOLOGICHE: per peronospora il rischio rimane basso, in queste condizioni meteorologiche non sono previsti trattamenti, fatta eccezione per le zone interne o fondovalle che hanno sviluppato infezioni in precedenza. Per oidio continuare a mantenere la copertura e alternare **zolfo** bagnabile con zolfo in polvere. In alternativa si possono utilizzare prodotti come **l'olio essenziale di arancio dolce** (Prev-Am plus), **bicarbonato di potassio** (es. Armicarb, Karma 85), **laminarina** (es. Vacciplant) in abbinamento a zolfo bagnabile, oppure **Bacillus pumilis** (es. Sonata) e **Bacillus amyloliquefaciens** (es. Taegro), quest'ultimo efficace anche contro botrite, così come il bicarbonato di potassio.