


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 29 del 23/09/2021 - SAVONA

PREVISIONI METEO – a cura di Arpal – www.arpal.gov		
VENERDÌ 24 settembre		Prevalentemente soleggiato al mattino. Possibili addensamenti in serata. Temperature max in calo
SABATO 25 settembre		Molto nuvoloso con possibili piovvaschi in serata. Temperature massime in calo.
DOMENICA 26 settembre		Possibili temporali con rovesci anche forti. Temperature in diminuzione.
LUNEDÌ 27 settembre		Variabile. Temperature in diminuzione.
MARTEDÌ 28 settembre		Variabile. Temperature in aumento.
MERCOLEDÌ 29 settembre		Variabile. Temperature in diminuzione.



MATURAZIONE UVE - (prelievo del 20.09.2021)									
COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI - °Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Albenga	Pigato	raccolto	20,5	raccolto	11,8	raccolto	5,5	raccolto	3,43
	Rossese	18,7	20,5	10,5	11,8	4,9	5,3	3,48	3,46
	Vermentino	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto
Finale Ligure	Barbarossa	21,9	20,5	12,7	11,8	4,8	5,6	3,40	3,48
	Granaccia	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto
	Vermentino	raccolto	22,1	raccolto	12,8	raccolto	5,4	raccolto	3,42
Noli	Lumassina	16,9	raccolto	9,3	raccolto	9,9	raccolto	3,06	raccolto
Ortovero	Pigato	23,6	raccolto	13,9	raccolto	4,6	raccolto	3,43	raccolto
Quiliano	Granaccia	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto	raccolto
	Lumassina	18,9	raccolto	10,7	raccolto	9,8	raccolto	3,04	raccolto
	MEDIA	20,0	20,9	11,4	12,1	6,8	5,5	3,28	3,45

SITUAZIONE ATTUALE - nel complesso la vendemmia è in conclusione nelle aree costiere o ad esse prossime ed è all'inizio nelle aree interne. Riguardo ai vigneti monitorati e oggetto di campionamento, questa settimana metà di essi sono stati vendemmiati, e i rimanenti, eccezion fatta per la Lumassina di Noli, sono comunque pronti per la raccolta (Barbarossa a Finale e Pigato ad Ortovero) o con valori prossimi a quelli ottimali. Anche le acidità, ad eccezione del vitigno Lumassina, son calate poco sotto i 5 g/l.

CONFRONTO CON L'ANNATA PRECEDENTE - rispetto al 2020 i vigneti monitorati che sono stati vendemmiati sono uno in meno, cinque nel 2021 e sei nel 2020. La situazione pertanto nel complesso è simile, seppur con diversità a livello di singolo vigneto.

Disponibile la **scheda tecnica dedicata alle principali operazioni di cantina**, scaricabile al link <https://tinyurl.com/RLcantina>

Attenzione!! Per valutare correttamente la maturazione delle uve del proprio vigneto è utile effettuare l'analisi. Il **Laboratorio Regionale di Sarzana (Pallodola)** fornisce un servizio specifico per valutare la maturazione delle uve (per maggiori informazioni: <https://tinyurl.com/RLanalisi>).

DIFESA FITOSANITARIA

Nonostante la difesa fitosanitaria dalle principali avversità si possa considerare conclusa da qualche settimana, nel periodo successivo alla vendemmia, quando le condizioni meteo sono ancora buone, è possibile attuare una strategia di difesa contro l'oidio che produrrà i suoi effetti nell'annata successiva. Poiché è una delle patologie più importanti e pericolose per le nostre realtà viticole, è molto importante impostare bene la lotta, in prevalenza di tipo preventivo, sia nella stagione primaverile-estiva, ma anche a fine stagione se vi è stata una forte pressione della malattia.

Alla luce di diverse sperimentazioni eseguite in Italia, risulta utile effettuare un trattamento fitosanitario volto a ridurre la formazione e la vitalità dei cleistoteci di oidio, cioè quegli organi che rappresentano la forma più frequente con cui il patogeno affronta la stagione invernale (svernamento) - scheda tecnica <http://bit.ly/RLoidiovite>

Il prodotto utilizzabile è l'**FAQ 10**, cioè un ceppo di *Ampelomyces quisqualis*, fungo parassita specifico per gli oidi.

Il periodo di fine vendemmia, e anche per buona parte di ottobre, caratterizzato da valori di umidità medio-alti e temperature spesso miti, costituisce un microclima ideale per lo sviluppo e diffusione del fungo, che potrà più facilmente colonizzare il vigneto.

L'utilizzo di AQ 10 si è dimostrato utile in applicazioni post-vendemmia per:

- riduzione dell'inoculo svernante - riduzione numero di interventi nella stagione vegetativa - riduzione della probabilità di sviluppo di resistenze.

Pertanto, oltre che in una logica di difesa integrata, tale prodotto risulta molto utile soprattutto in agricoltura biologica, dove la lotta è limitata a pochi prodotti (prevalentemente zolfo).

Poiché si tratta di un prodotto sotto forma di spore disidratate, si consiglia di attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative in etichetta. Inoltre è opportuno non andare troppo oltre col trattamento, in quanto il prodotto funziona in modo più efficace su cleistoteci non ancora completamente formati (visibili sulle foglie anche con una lente di ingrandimento di colore giallastro-marroncino, prima che diventino scuri e più resistenti).

Un altro prodotto utilizzabile in tale periodo, sempre per limitare l'inoculo svernante, è l'**olio essenziale di arancio dolce** (Prev-Am plus), utilizzabile anch'esso in agricoltura biologica.

